

УДК 519.21

В. И. МАСОЛ, канд. физ.-мат. наук (Киев. ун-т)

О распределении числа l -ступеней случайной двоичной последовательности с ограничениями

Изучаются совместное распределение случайных величин $\mu_{kn}(l_1), \dots, \mu_{kn}(l_s)$ и распределения некоторых функционалов от $\mu_{kn}(l)$ при $n \rightarrow \infty$. Здесь $\mu_{kn}(l), 1 \leq l \leq n - 1$, — число l -ступеней двоичной последовательности (д. п.), извлеченной случайно и равновероятно из совокупности всех n -мерных д. п., имеющих заданное число единиц и k 1-ступеней. Под l -ступенем д. п. понимается конфигурация вида 1 ... 0, у которой многоточие заменяет $(l - 1)$ -мерную д. п.

Вивчаються сумісній розподіл випадкових величин $\mu_{kn}(l_1), \dots, \mu_{kn}(l_s)$ і розподілі деяких функціоналів від $\mu_{kn}(l)$ при $n \rightarrow \infty$. Тут $\mu_{kn}(l), 1 \leq l \leq n - 1$, — число l -східців двійкової послідовності (д. п.), вилучене випадково і рівномірно із сукупності всіх n -мірних д. п., що мають задане число одиниць і k 1-сходин. Під l -сходиною д. п. розуміється конфігурація вигляду 1 ... 0, де крапки замінюють $(l - 1)$ -мірну д. п.

Пусть $\Omega(k, m_0, m_1)$ — совокупність двоичних послідовностей, кождая із яких містить m_0 нулів, m_1 одиниць, $m_0 + m_1 = n$, і k 1-ступеней, $k \geq 1, m_0 \geq k, m_1 \geq k$.

Л е м м а 1. Подмножество $\Omega(k, m_0, m_1, \rho)$ множества $\Omega(k, m_0, m_1)$, состоящее із двоичних послідовностей, имеючи ik i -ступеней, $i = 1, \dots, \rho$, обладаємою мощністю

$$|\Omega(k, m_0, m_1, \rho)| = C_{m_0-(\rho-1)k}^k C_{m_1-(\rho-1)k}^k. \quad (1)$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Число $|\Omega(k, m_0, m_1, \rho)|$ представим в виде

$$|\Omega(k, m_0, m_1, \rho)| = \sum_{\gamma \geq 0} c(k, m_1 - \gamma - (\rho - 1)k) \sum_{\delta \geq 0} c(k, m_0 - \delta - (\rho - 1)k),$$

где $c(k, R)$ — количество композиций числа R точно с k частями. Известно [1, с. 67], что $c(k, R) = C_{R-1}^{k-1}$. Используя последние два равенства, приходим к (1). Лемма 1 доказана.

Пусть $l_i, i = \overline{1, s}$, — целые положительные числа, не зависящие от n ; $L = \max(l_1, \dots, l_s)$, $h = \min(m_0, m_1)$, $H = \max(m_0, m_1)$.

Теорема 1. Если h и k — конечные константы, не зависящие от n , то имеет место слабая сходимость

$$(\mu_{kn}(l_1), \dots, \mu_{kn}(l_s)) \xrightarrow{\omega} (\mu_k(l_1), \dots, \mu_k(l_s)), \quad n \rightarrow \infty,$$

где $\mu_k(l_i), i = \overline{1, s}$, — случайные величины, совместное распределение которых однозначно определяется моментами: при целых $t_i \geq 0, i = \overline{1, s}$,

$$M \prod_{i=1}^s (\mu_k(l_i))^{t_i} = (C_h^k)^{-1} \sum_{k!} \left(\prod_{j=0}^{L-1} x_j! \right)^{-1} C_{h-(L-1)k+G}^{k-X} \prod_{i=1}^s (kl_i - J_i)^{t_i}, \quad (2)$$

где суммирование осуществляется по всем решениям в целых неотрицательных числах уравнения $x_0 + x_1 + \dots + x_{L-1} = k$,

$$X = \sum_{j=0}^{L-2} x_j, \quad G = \sum_{j=0}^{L-2} (L-j-2)x_j, \quad J_i = \sum_{j=0}^{l_i-2} (l_i-j-1)x_j, \quad i = \overline{1, s}.$$

Доказательство. Назовем узлом невозрастающую последовательность, которая начинается с единицы и заканчивается нулем. Очевидно, произвольный элемент f множества $\Omega(k, m_0, m_1)$ содержит точно k узлов; две компоненты последовательности f , образующие l -ступень, могут принадлежать различным узлам. Обозначим $\Delta_{ij}(l)$ число l -ступеней f , каждая из которых содержит одну компоненту в i -м узле и другую компоненту в $(i+j)$ -узле, $0 \leq i+j \leq k$. Пусть $\gamma_i(\delta_i)$ — число единиц (нулей) в i -м узле последовательности f , не образующих 1-ступень, $1 \leq i \leq k$. Тогда, например, для $j = 0$ и $l \geq 2$ $\Delta_{ij}(l) = \chi(\gamma_i \geq 0, \delta_i \geq l-1) + \chi(\gamma_i \geq 1, \delta_i \geq l-2) + \dots + \chi(\gamma_i \geq l-1, \delta_i \geq 0)$, где $\chi(E)$ — индикатор события E . В общем случае для $0 \leq j \leq k-i$ и $l \geq 2$ находим

$$\Delta_{ij}(l) = \sum_{r=i+1}^{i+j} \left(\prod_{r=t+1}^i \chi(\gamma_r = a_r, \delta_{r-1} = b_{r-1}) \right) \chi(\gamma_i \geq a_i, \delta_{i+j} \geq b_{i+j}), \quad (3)$$

где суммирование осуществляется по всем решениям в целых неотрицательных числах уравнения $a_i + b_i + a_{i+1} + b_{i+1} + \dots + a_{i+j} + b_{i+j} = l - 2j - 1$. Соотношение (3) и равенство $|\Omega(k, m_0, m_1)| = C_{m_0}^k C_{m_1}^k$, получаемое из леммы 1 при $\rho = 1$, позволяют представить математическое ожидание случайной величины $(\mu_{kn}(l_1))^{t_1} \dots (\mu_{kn}(l_s))^{t_s}$ в виде

$$M \prod_{v=1}^s (\mu_{kn}(l_v))^{t_v} = (C_{m_0}^k C_{m_1}^k)^{-1} \sum_{v=1}^s \prod_{i=1}^k \left(\sum_{j=0}^{k-i} \sum_{l=j}^{k-l} \Delta_{ij}(l_v) \right)^{t_v}, \quad (4)$$

где Σ обозначает суммирование по всем решениям в целых неотрицательных числах уравнений $\gamma_0 + \gamma_1 + \dots + \gamma_k = m_1 - k, \delta_0 + \delta_1 + \dots + \delta_k = m_0 - k$. Оценка

$$(C_{m_0}^k C_{m_1}^k)^{-1} \sum \Delta_{ij}(l_v) = O(H^{-1}), \quad n \rightarrow \infty, \quad (5)$$

где Σ — знак из (4), $1 \leq j \leq k-i, i = \overline{1, k}, v = \overline{1, s}$, следует из того, что левая часть соотношения (5) удовлетворяет при $n \rightarrow \infty$ неравенству

$$(C_{m_0}^k C_{m_1}^k)^{-1} \sum \Delta_{ij}(l_v) \leq A (C_h^k)^{-1} \sum_{\alpha_0 + \alpha_1 + \dots + \alpha_k = H-k} 1,$$

где $A, 0 < A < \infty$, — константа, а среди целых неотрицательных чисел — $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_k$ найдется хотя бы одно, не превышающее l_v . После возведения каждого сомножителя в правой части (4) в степень t_v и выполнения умноже-

ния по параметру $v \in \{1, 2, \dots, s\}$ получаем при $n \rightarrow \infty$ с учетом (5)

$$M \sum_{v=1}^s (\mu_{kn}(l_v))^{t_v} = (C_{m_0}^k C_{m_1}^k)^{-1} \sum_{v=1}^s \prod_{i=1}^k \left(\sum_{a_i+b_i=l_v-1} \chi(\gamma_i \geq a_i, \delta_i \geq b_i) \right)^{t_v} + O(H^{-1}), \quad (6)$$

где сохранены обозначения из соотношения (4). От (6) несложно перейти к (2), если воспользоваться следующими равенствами $\Sigma 1 = C_{h+G-(L-1)k}^{k-X}$, где суммирование осуществляется по всем решениям в целых неотрицательных числах уравнения $\beta_0 + \beta_1 + \dots + \beta_k = h - k$, причем x_j компонент среди $\{\beta_1, \dots, \beta_k\}$ в каждом решении совпадают с j , $j = \overline{0, L-2}$, а оставшиеся элементы множества $\{\beta_1, \dots, \beta_k\}$ принимают значения большие или равные $L-1$;

$$\sum_{i=1}^k \sum_{a=0}^{l_v-1} \chi(\beta_i \geq a) = kl_v - J_v, \quad v = \overline{1, s}.$$

Пусть $t_1 = \dots = t_{j-1} = t_{j+1} = \dots = t_s = 0$, $t_j \geq 0$, тогда, применяя $L - t_j$ раз к правой части (2) формулу свертки Вандермонда [2, с. 17], находим явные выражения для $M(\mu_k(l_j))^{t_j}$, $j = \overline{1, s}$, позволяющие убедиться в справедливости равенства

$$\sum_{t \geq 1} \left(\sum_{j=1}^s M(\mu_k(l_j))^t \right)^{-1/2t} = \infty, \quad (7)$$

выполнение которого достаточно для того, чтобы s -мерное распределение однозначно определялось своими моментами (см., например, [3, с. 167]). Теорема 1 доказана.

Теорема 2. Если при $n \rightarrow \infty$ $h \rightarrow \infty$, $k = \text{const} < \infty$, то имеет место слабая сходимость

$$(k^{-1} \mu_{kn}(l_1), \dots, k^{-1} \mu_{kn}(l_s)) \xrightarrow{\omega} (l_1, \dots, l_s), \quad n \rightarrow \infty.$$

Доказательство. Аналогично (6) находим, что при $n \rightarrow \infty$ для целых $t_v \geq 0$, $v = \overline{1, s}$,

$$M \prod_{v=1}^s (\mu_{kn}(l_v))^{t_v} = (C_{m_0}^k C_{m_1}^k)^{-1} \sum_{v=1}^s \prod_{i=1}^k \left(k^{-1} \sum_{a+b=l_v-1} \chi(\gamma_i \geq a, \delta_i \geq b) \right)^{t_v} + O(h^{-1}) = \prod_{v=1}^s l_v^{t_v} + O(h^{-1}),$$

где Σ — знак из (4). Не вызывающая затруднений проверка равенства (7) завершает доказательство теоремы 2.

Замечание. В теоремах 1 и 2 число k предполагалось фиксированным. Если $k = k(n)$ при $n \rightarrow \infty$, то, вообще говоря, зависимость между случайными величинами $\mu_{kn}(l_1), \dots, \mu_{kn}(l_s)$ усложняется, о чем свидетельствует, в частности, изучение коэффициента корреляции случайных величин $\mu_{kn}(2), \mu_{kn}(3)$, проведенное в теореме 4 (хотя отдельно для $\mu_{kn}(2), \mu_{kn}(3)$ можно получить, например, утверждения типа ЗБЧ при условии, что $k \rightarrow \infty$ (см. теорему 3)).

Теорема 3. Если при $n \rightarrow \infty$ $k \rightarrow \infty$, $m_0^{-1}k \rightarrow q_0$, $m_1^{-1}k \rightarrow q_1$, то имеет место слабая сходимость

$$k^{-1} \mu_{kn}(2) \xrightarrow{\omega} 2 - q_0 - q_1, \quad n \rightarrow \infty, \quad (8)$$

$$k^{-1} \mu_{kn}(3) \xrightarrow{\omega} 3(1 - q_0 - q_1) + (q_0 + q_1)^2, \quad n \rightarrow \infty. \quad (9)$$

Доказательство. Проверим справедливость (9). Для $t \geq 0$ математическое ожидание случайной величины $\mu_{kn}^t < (3)$ можно представить в виде

$$M\mu_{kn}^t(3) = (C_{m_0}^k C_{m_1}^k)^{-1} \Sigma (A + B)^t, \quad (10)$$

где Σ — знак из (4), $A = a_1 + \dots + a_k$, $a_i = u_{i_1} + u_{i_2} + \dots + u_{i_s}$, $u_{i_1} = \chi (\gamma_i \geq 2)$, $u_{i_2} = \chi (\gamma_i \geq 1, \delta_i \geq 1)$, $u_{i_3} = \chi (\delta_i \geq 2)$, $i = \overline{1, k}$, $B = b_1 + \dots + b_{k-1}$, $b_j = \chi (\delta_j = 0, \gamma_{j+1} = 0)$, $j = \overline{1, k-1}$. В принятых обозначениях находим для целых $t \geq 0$ и $r \in \{0, 1, \dots, t\}$

$$A^r B^{t-r} = r! (t-r)! \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq k} a_{i_1} \dots a_{i_r} + \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_{t-r} \leq k-1} b_{j_1} \dots b_{j_{t-r}} + O(k^{t-1}), \quad k \rightarrow \infty. \quad (11)$$

Для произвольных наборов $\{i_1, \dots, i_r\}$ ($1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq k$)

$$a_{i_1} \dots a_{i_r} = \sum_{r_1+r_2+r_3=r} \Sigma' \prod_{v=1}^3 \prod_{i \in I_v} u_{iv}, \quad (12)$$

где знак Σ' обозначает суммирование по всем попарно непересекающимся подмножествам I_1, I_2, I_3 множества $\{i_1, \dots, i_r\}$, мощности которых соответственно равны r_1, r_2, r_3 , $r_1 + r_2 + r_3 = r$. Если $\{i_1, \dots, i_r\} \cap \{j_1, \dots, j_{t-r}, j_1 + 1, \dots, j_{t-r} + 1\} \neq \emptyset$, то

$$b_{j_1} \dots b_{j_{t-r}} \prod_{v=1}^3 \prod_{i \in I_v} u_{iv} = 0, \quad (13)$$

иначе

$$\sum \left(\prod_{v=1}^{t-r} b_{j_v} \right) \prod_{v=1}^3 \prod_{i \in I_v} u_{iv} = \prod_{i=0}^1 C_{m_i - 2r_3 - 2i - r_2 - t + r}^{k-i+r}. \quad (14)$$

Соотношения (11) — (14) позволяют заключить следующее:

$$(k^t C_{m_0}^k C_{m_1}^k)^{-1} \Sigma A^r B^{t-r} \rightarrow (q_0 q_1)^{t-r} ((1 - q_0)^2 + (1 - q_1)^2 + (1 - q_0)(1 - q_1))^r, \quad n \rightarrow \infty. \quad (15)$$

Используя (10) и (15), получаем при $n \rightarrow \infty$

$$k^{-t} M\mu_{kn}^t(3) \rightarrow (3(1 - q_0 - q_1) + (q_0 + q_1)^2)^t,$$

что равносильно (9). Аналогично (9) можно проверить (8). Теорема 3 доказана.

Коэффициент корреляции случайных величин μ_{kn} (2), μ_{kn} (3) обозначим через ρ_n . В дальнейшем будем использовать такие сокращения:

$$Q = 2q_1^2 q_0^2 + q_1(1 - q_1)f(q_1, q_0) + q_0(1 - q_0)f(q_0, q_1),$$

$$f(q_1, q_0) = 5 - 7q_0 + 4q_0^2 - q_0^3 - q_1(3q_0^2 - 15q_0 + 14) + q_1^2(13 - 8q_0) - 4q_1^3,$$

$\varepsilon_i = m_i - k$, $i \in \{0, 1\}$, $\sigma(1)$ — величина, стремящаяся к нулю при $n \rightarrow \infty$.

Теорема 4. Пусть при $n \rightarrow \infty$ $h \rightarrow \infty$, $m_1^{-1}k \rightarrow q_1$, $m_0^{-1}k \rightarrow q_0$. Тогда

1) если справедливо хотя бы одно из соотношений $q_1 \in (0, 1)$, $q_0 \in (0, 1)$, то $\rho_n \rightarrow 2(1 - q_1 - q_0)((q_1(1 - q_1)^2 + q_0(1 - q_0)^2)/Q)^{1/2}$, $n \rightarrow \infty$;

2) $\rho_n \rightarrow 2/\sqrt{5}$, $n \rightarrow \infty$, при условии $q_1 = q_0 = 0$;

3) $\rho_n \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$, при условии $q_1 = q_0 = 1$;

4) если $q_1 = 1$, $q_{1-i} = 0$ и при $n \rightarrow \infty$ $m_{1-i} m_i^{-3} \rightarrow v$, $\varepsilon_i \rightarrow \varepsilon$, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_n = \begin{cases} \varepsilon v / ((1 + \varepsilon v)(1 + \varepsilon^2 v))^{1/2}, & \text{если } v < \infty, 0 \leq \varepsilon < \infty, \\ 1/\sqrt{\varepsilon}, & \text{если } v = \infty, 1 \leq \varepsilon < \infty, \\ 0, & \text{если либо } \varepsilon = \infty, \text{ либо } \varepsilon = 0, v = \infty, \end{cases}$$

где $i \in \{0, 1\}$.

Доказательство теоремы 4 может быть получено с помощью лемм 2—4.

Лемма 2. Пусть выполняются условия 1—4 теоремы 4. Тогда дисперсия случайной величины μ_{kn} (3) удовлетворяет соответственно соотношениям

- 1) $D\mu_{kn}(3) = kQ(1 + o(1)), n \rightarrow \infty$, где $Q > 0$;
- 2) $D\mu_{kn}(3) = 5k^2 n(1 + o(1))/m_1 m_0, n \rightarrow \infty$;
- 3) $D\mu_{kn}(3) = n(1 + o(1)), n \rightarrow \infty$;
- 4) при $n \rightarrow \infty$

$$D\mu_{kn}(3) = \begin{cases} m_i^2(1 + \varepsilon v + o(1))/m_{1-i}, & \text{если } v < \infty, 0 \leq \varepsilon < \infty, \\ \varepsilon(1 + o(1))/m_i, & \text{если } v = \infty, 1 \leq \varepsilon < \infty, \\ \left(\frac{m_i^2}{m_{1-i}} + \frac{\varepsilon^3}{m_i^2} + \frac{\varepsilon_i}{m_i}\right)(1 + o(1)), & \text{если } \varepsilon^2 m_{1-i} m_i^{-3} \rightarrow \mu, n \rightarrow \infty, \\ & \text{и } \mu = \varepsilon = \infty, \\ m_i^2(1 + o(1))/m_{1-i}, & \text{если либо } \mu < \infty, \varepsilon = \infty, \text{ либо } \varepsilon = 0, v = \infty, \end{cases}$$

здесь $i \in \{0, 1\}$.

Доказательство. Неравенство из 1 следует из того, что если $q_1 \in (0, 1)$ ($q_0 \in (0, 1)$), то функция $\varphi(q_1) = f(q_1, q_0)$ ($\varphi(q_0) = f(q_0, q_1)$) не обращается в 0 при $q_0 \in [0, 1]$ ($q_1 \in [0, 1]$). Обоснование оставшихся соотношений леммы 2 нетрудно осуществить, исходя от выражения (10) для моментов случайной величины μ_{kn} (3).

Лемма 3. Для $m_0 \geq 3, m_1 \geq 3$ ковариация случайных величин $\mu_{kn}(2), \mu_{kn}(3)$ удовлетворяет равенству $\text{Cov}(\mu_{kn}(2), \mu_{kn}(3)) = \Phi(m_1, m_0) + \Phi(m_0, m_1)$, где $\Phi(m_1, m_0) = k^2(1 - km_1^{-1})[(m_1 - 2)^{-1}(1 - k(m_1 - 1)^{-1}) \times (1 - 2km_1^{-1}) + (m_1 - 1)^{-1}(1 - km_1^{-1})(1 - (2k - 1)m_0^{-1})]$.

Доказательства леммы 3 и последующей леммы 4, заключающиеся в преобразовании соответственно выражений $\Sigma(A + B)C - \Sigma(A + B)\Sigma C, \Sigma C^2 - (\Sigma C)^2$, в записи которых использованы обозначения из (10), $C = \sum_{i=1}^k (\chi(v_i \geq 1) + \chi(\delta_i \geq 1))$, не вызывают затруднений.

Лемма 4. Для $m_0 \geq 2, m_1 \geq 2$ дисперсия случайной величины $\mu_{kn}(2)$ удовлетворяет равенству $D\mu_{kn}(2) = k^2[(m_1 - 1)^{-1}(1 - km_1^{-1})^2 + (m_0 - 1)^{-1} \times (1 - km_0^{-1})^2]$.

Всюду далее μ будет обозначать случайную величину, распределение которой однозначно определяется моментами; t (с индексами или без них)—целое число. Положим $\xi_n = h^{-1} \max_{t_1 \leq t \leq t_2} \mu_{1n}(t)$, $1 \leq t_1 \leq t_2 \leq n - 1$. Легко убедиться в справедливости леммы 5.

Лемма 5. Для $s \geq 0$ математическое ожидание случайной величины ξ_n^s удовлетворяет соотношению

$$M\xi_n^s = H^{-1}h^{-s-1} \sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^H \{t_2 \chi(\min(i, j) > t_2) + \min(i, j) [\chi(t_1 \leq \min(i, j) \leq t_2) +$$

$$+ \chi(\min(i, j) < t_1, \max(i, j) \geq t_1)] + \max(0, i + j - t_1) \chi(t_1 > \max(i, j))\}^s.$$

Используя лемму 5 и метод моментов, несложно получить доказательства теорем 5—8.

Теорема 5. Пусть $t_1 \leq h \leq t_2$. Тогда

1) если при $n \rightarrow \infty$

$$H^{-1}h \rightarrow \lambda, \quad (16)$$

$$h^{-1}t_1 \rightarrow g_1, \quad (17)$$

$$h \rightarrow \infty, \quad (18)$$

то $\xi_n \xrightarrow{\omega} \mu$, $n \rightarrow \infty$, где для $s > 0$ $M\mu^s = (s+1)^{-1}(1-\lambda(s+g_1^{s+2})(s+2)^{-1})$:
2) если

$$h = \text{const} < \infty, \quad (19)$$

то $\xi_n \xrightarrow{\omega} \mu$, $n \rightarrow \infty$, где для $s \geq 0$ $M\mu^s = h^{-s-1} \sum_{i=1}^h i^s$.

Теорема 6. Пусть $h \leq t_1 \leq H$. Тогда

1) если выполняются условия (16), (18) и

$$H^{-1}t_1 \rightarrow g, \quad n \rightarrow \infty, \quad (20)$$

то $\xi_n \xrightarrow{\omega} \mu$, $n \rightarrow \infty$, где для $s > 0$ $M\mu^s = (s+1)^{-1}(\lambda(s+2)^{-1} - g + 1)$;

2) если выполняются условия (19) и (20), то $\xi_n \xrightarrow{\omega} \mu$, $n \rightarrow \infty$, где для $s > 0$ $M\mu^s = h^{-s-1}(1-g) \sum_{i=1}^h i^s$.

Теорема 7. Пусть $t_2 \leq h$. Тогда

1) если выполняются условия (16) — (18) и $h^{-1}t_2 \rightarrow g_2$, $n \rightarrow \infty$, то
 $\xi_n \xrightarrow{\omega} \mu$, $n \rightarrow \infty$, где при $s > 0$

$$M\mu^s = \lambda(s+1)^{-1}(s+2)^{-1}((g_2 - g_1)^{s+2} - g_2^{s+2}(2s+3)) + (s+1)^{-1} \times \\ \times g_2^{s+1}(1+\lambda) + (1-\lambda g_2)(1-g_2)g_2^s;$$

2) если выполняются условия (19) и $t_2 = \text{const} < \infty$, то $\xi_n \xrightarrow{\omega} \mu$,
 $n \rightarrow \infty$, где для $s \geq 0$ $M\mu^s = (1-h^{-1}t_2)(t_2/h)^s + h^{-s-1} \sum_{i=1}^{t_2} i^s$.

Теорема 8. Пусть $H \leq t_1$. Тогда если при $n \rightarrow \infty$ $(n-t_1)h^{-1} \rightarrow v_0$,
 $(n-t_1)H^{-1} \rightarrow v_1$, то $\xi_n \xrightarrow{\omega} \mu$, $n \rightarrow \infty$, где при $s > 0$ $M\mu^s = v_0v_0^{s+1}(s+1)^{-1} \times$
 $\times (s+2)^{-1}$.

Положим $\zeta_n = (hH)^{-1} \sum_{l \leq t} \mu_{1n}(l)$.

Лемма 6. Для $s \geq 0$ и $1 \leq t \leq n-1$ математическое ожидание
случайной величины ζ_n^s удовлетворяет соотношению

$$M\zeta_n^s = (hH)^{-s-1} \sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^H \left\{ 2^{-1} \min(t, \min(i, j))(1 + \min(t, \min(i, j))) + \right. \\ \left. + \max(0, \min(t, \max(i, j)) - \min(i, j)) \min(i, j) + \Sigma(i+j-v)^s \right\},$$

где знак Σ обозначает суммирование по параметру $v \in [1 + \max(i, j),$
 $\min(t, i+j)]$.

Доказательство. Пусть узел содержит i единиц и j нулей.
Отрезок $[1, t]$ разделим на три интервала $[1, \min(t, \min(i, j))]$, $[\min(t, \min(i, j)) + 1, \min(t, \max(i, j))]$, $[\min(t, \max(i, j)) + 1, \min(t, i+j)]$. Сумма чисел l -ступеней равняется

$$\sum_{l=1}^{\min(t, \min(i, j))} l \cdot \max(0, \min(t, \max(i, j)) - \min(i, j)) \min(i, j), \\ \sum_{l=1+\max(i, j)}^{\min(t, i+j)} (i+j-l),$$

если параметр t изменяется соответственно в первом, втором и третьем интервалах. Теперь завершение доказательства леммы 6 не вызывает затруднений.

Теорема 9. Пусть $1 \leq t \leq h$. Тогда

- 1) если $t = \text{const} < \infty$, то $\zeta_n \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$;
- 2) если при $n \rightarrow \infty$ $t \rightarrow \infty$, $h^{-1}t \rightarrow \varphi$,

$$H^{-1}t \rightarrow \Theta, \quad (21)$$

то $\zeta_n \xrightarrow{\omega} \mu$, $n \rightarrow \infty$, где для целых $s \geq 0$

$$\begin{aligned} M\mu^s = (\Theta\varphi)^s & \left\{ \Theta\varphi(s+1)^{-2} (C_{2(s+1)}^v)^{-1} + (\Theta + (1-2\Theta)\varphi) \sum_{v=0}^s C_s^v (-2)^{-v} \times \right. \\ & \times (s+v+1)^{-1} + (1-\Theta)(1-\varphi) 2^{-s} + \Theta\varphi \sum_{\substack{s_1+\dots+s_4=s, \\ s_i \geq 0, i=1,\dots,4}} s! (s_1! \cdots s_4!)^{-1} \times \\ & \times (-1)^{s_2} (-2)^{-s_4} (2s-s_1+2)^{-1} (s_3+2s_4+1)^{-1} \left. \right\}. \end{aligned}$$

Доказательство. Используя лемму 6, находим

$$\begin{aligned} M\zeta_n^s = (hH)^{-s-1} & \left\{ \sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^{t-i} (ij)^s + \sum_{i=1}^t \sum_{j=t-i+1}^t (ij - 2^{-1}(i+j-t-1)) \times \right. \\ & \times (i+j-t)^s + (n-2t) \sum_{i=1}^t i^s (t-2^{-1}(i-1))^s + (h-t)(H-t) \times \\ & \times (2^{-1}t(t+1))^s \left. \right\}. \end{aligned}$$

С помощью последнего равенства, полиномиальной формулы и соотношений

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n i^s & = n^{s+1} (1 + O(1/n))/(s+1), \quad n \rightarrow \infty, \quad \sum_{i=0}^{s+1} (-1)^i C_{s+1}^i (s+i+1)^{-1} = \\ & = 1/(s+1) C_{2(s+1)}^{s+1} \end{aligned}$$

[4, с. 611] несложно завершить доказательство теоремы 9.

Теорема 10. Пусть $h \leq t \leq H$. Тогда

1) если выполняются условия (19) и (21), то $\zeta_n \xrightarrow{\omega} \mu$, $n \rightarrow \infty$, где для $s \geq 0$ $M\mu^s = \Theta^s h^{-s-1} (1 - \Theta s(s+1)^{-1}) \sum_{i=1}^h i^s$;

2) если $t = \text{const} < \infty$, то $\zeta_n \xrightarrow{\omega} 0$, $n \rightarrow \infty$;

3) если выполняются условия (18), (21) и $t^{-1}h \rightarrow d$, $n \rightarrow \infty$, то $\zeta_n \xrightarrow{\omega} \mu$, $n \rightarrow \infty$, где при целых $s \geq 0$

$$\begin{aligned} M\mu^s & = \Theta^s \left\{ (1-\Theta) \sum_{v=0}^s C_s^v (-d/2)^v (s+v+1)^{-1} + \Theta(s+1)^{-1} \times \right. \\ & \times \sum_{v=0}^{s+1} C_{s+1}^v (-d)^v (s+v+1)^{-1} + \Theta \sum_{\substack{s_1+\dots+s_4=s, \\ s_i \geq 0, i=1,\dots,4}} s! (s_1! \cdots s_4!)^{-1} (-1)^{s_2} \times \\ & \times d^{s-s_1+1} (-2)^{-s_4} (2s-s_1+2)^{-1} (s_3+2s_4+1)^{-1} \left. \right\}. \end{aligned}$$

Теорема 11. Пусть $H \leq t \leq n - 1$. Тогда

1) если выполняется условие (19), то $\zeta_n \xrightarrow{\omega} \mu$, $n \rightarrow \infty$, где при $s \geq 0$
 $M\mu^s = h^{-s-1}(s+1)^{-1} \sum_{i=1}^h i^s$;

2) если выполняются условия (18) и $t^{-1}h \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$, то $\zeta_n \xrightarrow{\omega} \mu$,
 $n \rightarrow \infty$, где при целых $s \geq 0$ $M\mu^s = (s+1)^{-2}$;

3) если выполняются условия (18), (21), $t^{-1}h \rightarrow d$, $n \rightarrow \infty$, $d > 0$, то
 $\zeta_n \xrightarrow{\omega} \mu$, $n \rightarrow \infty$, где при целых $s \geq 0$

$$M\mu^s = ((\Theta - 1)/\Theta d)^{s+1} (s+1)^{-2} + d^{-s-1} (s+1)^{-1} \sum_{v=0}^{s+1} C_{s+1}^v (-\Theta)^{-v} \times$$
$$\times (s+v+1)^{-1} ((\Theta d)^{s+v+1} - (\Theta - 1)^{s+v+1}) + (\Theta d)^{-s-1} \times$$
$$\times \sum_{\substack{s_1+\dots+s_6=s, \\ s_i \geq 0, i=1,\dots,6}} s! (s_1! \cdots s_6!)^{-1} (-1)^{s_3} (1 + \Theta d - \Theta)^{2(s+1-s_1)-s_2-s_4} (-2)^{-s_4} \times$$
$$\times (\Theta - 1)^{s_1+s_5} (2 - \Theta)^{s_2} ((2(s-s_1) - s_2 - s_5 + 2)(s_4 + s_5 + 2s_6 + 1))^{-1}.$$

Доказательство теорем 10 и 11 можно осуществить аналогично доказательству теоремы 9.

1. Эндрюс Г. Теория разбиений.— М. : Наука, 1982.— 256 с.
2. Риордан Дж. Комбинаторные тождества.— М. : Наука, 1982.— 256 с.
3. Прохоров Ю. В., Розанов Ю. А. Теория вероятностей. Основные понятия. Предельные теоремы. Случайные процессы.— М. : Наука, 1987.— 400 с.
4. Прудников А. П., Брычков Ю. А., Маричев О. И. Интегралы и ряды.— М. : Наука, 1981.— 800 с.

Получено 11.05.89