

©2004. Н.А. Сидоров

МИНИАЛЬНЫЕ ВЕТВИ РЕШЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ И АСИМПТОТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯРИЗАТОРЫ

Получены достаточные условия существования и единственности решений максимального порядка малости нелинейных уравнений, зависящих от параметра. Введены понятия левого и правого асимптотического регуляризатора линейной оператор-функции $B(\lambda)$, отвечающей линейризации исходного нелинейного уравнения (1). В случае, когда $\lambda = 0$ является фредгольмовой точкой $B(\lambda)$, дан способ построения таких регуляризаторов. На этой основе предложен новый метод последовательных приближений, сходящийся к ветви максимального порядка малости при нулевом начальном приближении. В отличие от работ [5, 6] в этом методе не нужно знать хорошее начальное приближение искомой ветви.

Пусть E_1, E_2 — банаховы пространства. Рассмотрим уравнение

$$B(\lambda)x = R(x, \lambda) + b(\lambda), \quad (1)$$

где λ принадлежит окрестности нуля линейного нормированного пространства Λ , $B(\lambda)$ — линейная оператор-функция с плотной в E_1 областью определения, не зависящей от λ . Нелинейный оператор $R : \Omega \subset E_1 \times \Lambda \rightarrow E_2$ предполагается непрерывным по x и λ и непрерывно дифференцируемым по x в смысле Фреше в окрестности нуля, причем $\|R(x, \lambda)\| = O(\|x\|^l), l > 1$.

Функция $b(\lambda) : \Lambda \rightarrow E_2$ непрерывна по λ , причем $\|b(\lambda)\| = o(\|\lambda\|^m)$.

Пусть ω — открытое множество в Λ , замыканию которого принадлежит точка $\lambda = 0$. Такое множество назовем секториальной окрестностью точки $\lambda = 0$ и введем следующее условие

$$I. \|B^{-1}(\lambda)\| = O\left(\frac{1}{\|\lambda\|^p}\right) \text{ при } \omega \ni \lambda \rightarrow 0.$$

Рассмотрим задачу построения решений $x(\lambda) \rightarrow 0$ при $\omega \ni \lambda \rightarrow 0$ уравнения (1). Так как в силу условия I. оператор $B(0)$ не является непрерывно обратимым, то уравнение (1) может не иметь малых решений или иметь несколько таких решений различных порядков малости [1, 2, 5, 6].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Решение $x(\lambda)$ назовем минимальной ветвью, если уравнение (1) не имеет малых решений более высокого порядка малости, чем $\|x(\lambda)\|$ при $\omega \ni \lambda \rightarrow 0$.

ТЕОРЕМА 1. Пусть выполнено условие I., причем $t \geq p \cdot \frac{1}{l-1}$. Тогда уравнение (1) имеет в области $\omega_1 \subseteq \omega$ единственную минимальную ветвь $x(\lambda)$. Более того, последовательность $x_m(\lambda)$, где

$$x_m = B^{-1}(\lambda)(R(x_{m-1}, \lambda) + b(\lambda)), \quad x_0 = 0,$$

сходится к этой ветви.

В силу оценки I. и неизбежных погрешностей вычислений построение последовательности x_m требует регуляризации [1]. Этот вопрос рассмотрим ниже.

Далее $B(0) \stackrel{def}{=} B_0$ — нормально разрешимый оператор нулевого нётерова индекса (кратко, фредгольмов оператор), $\dim N(B_0) = n \geq 1$. Введем его псевдорезольвенту

Шмидта [2]

$$\Gamma = (B_0 + \sum_1^n \langle \cdot, \gamma_i \rangle z_i)^{-1}$$

и обозначение $A(\lambda) \stackrel{def}{=} B(\lambda) - B_0$. Здесь γ_i и z_i биортогональны к базисным элементам $\varphi_i \in N(B_0)$ и $\psi_i \in N(B_0^*)$ соответственно.

Пусть

$$\text{II. } \|A(\lambda)x\| \leq a(\lambda)(\|x\| + b\|B_0x\|),$$

где $a(\lambda) \rightarrow 0$ при $\omega \ni \lambda \rightarrow 0$, $b - const$.

Тогда $A(\lambda)\Gamma$ — непрерывная оператор-функция и оператор $I - A(\lambda)\Gamma$ непрерывно обратим в области $\omega_1 \subseteq \omega$, где $\|A(\lambda)\Gamma\| < 1$.

Пусть

$$\text{III. } \det \langle (I - A(\lambda)\Gamma)^{-1} A(\lambda)\varphi_i, \psi_n \rangle \sim c\|\lambda\|^\alpha.$$

Если $A(\lambda)\Gamma$ достаточно гладок относительно λ и

$$\det \langle \sum_{j=0}^{p-1} (A(\lambda)\Gamma)^j A(\lambda)\varphi_i, \psi_k \rangle \sim c\|\lambda\|^\alpha,$$

где $p \geq \alpha$, то условие III. будет выполнено.

ЛЕММА 1. Пусть выполнены условия II, III. Тогда условие I будет выполнено с порядком p .

Далее $B(\lambda) = B_0 - \lambda B_1$, где $\lambda \in R^1$, $\|B_1x\| \leq a(\|x\| + b\|B_0x\|)$, B_0 — фредгольмов.

Пусть

IV. Элементы $\{\varphi_i^{(k)}\}$, $i = \overline{1, n}$, $k = \overline{1, p_i}$ образуют полный B_1 -жорданов набор оператора B_0 , а функционалы $\{\psi_i^{(k)}\}$, $i = \overline{1, n}$, $k = \overline{1, p_i}$ образуют полный B_1^* -жорданов набор оператора B_0^* (см. [2]).

Тогда условие I будет выполнено в проколотой окрестности точки $\lambda = 0$ с порядком $p = \max(p_1, \dots, p_n)$ и применима теорема 1. Покажем, что в этом случае можно построить регуляризованный метод последовательных приближений для вычисления минимальной ветви, не требующий обращения оператора $B(\lambda)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Линейный оператор $\Gamma(\lambda)$, определенный при $\lambda \in \omega$, есть левый асимптотический регуляризатор оператора $B(\lambda)$, если $\lim_{\omega \ni \lambda \rightarrow 0} \Gamma(\lambda)B(\lambda)x = x$ при $\forall x \in D(B)$.

Аналогичным образом вводится правый асимптотический регуляризатор оператора $B(\lambda)$.

ЛЕММА 2. Пусть $B(\lambda) = B_0 - \lambda B_1$ и выполнено условие IV. Тогда операторы

$$\Gamma_l(\lambda) \stackrel{def}{=} \Gamma - \sum_{i=1}^n \sum_{s=1}^{p_i} \frac{1}{\lambda^s} \langle \cdot, \psi_i^{(p_i+1-s)} \rangle \varphi_i^{(1)},$$

$$\Gamma_r(\lambda) \stackrel{def}{=} \Gamma - \sum_{i=1}^n \sum_{s=1}^{p_i} \frac{1}{\lambda^s} \langle \cdot, \psi_i^{(1)} \rangle \varphi_i^{(p_i+1-s)}$$

будут соответственно левым и правым асимптотическим регуляризаторами оператора $B(\lambda)$.

Доказательство следует из операторных тождеств

$$\begin{aligned}\Gamma_l(\lambda)(B_0 - \lambda B_1) &= I - \lambda \Gamma B_1, \\ (B_0 - \lambda B_1)\Gamma_r(\lambda) &= I - \lambda B_1 \Gamma.\end{aligned}$$

ТЕОРЕМА 2. Пусть $B(\lambda) = B_0 - \lambda B_1$, $\|R(x, \lambda)\| = O(\|x\|^l)$, $\|b(\lambda)\| = o(|\lambda|^m)$, выполнено условие IV, $p = \max(p_1, \dots, p_n)$, $m \geq p_{l-1}^l$.

Тогда уравнение (1) имеет единственную минимальную ветвь решений $x(\lambda)$. Порядок малости этой ветви больше чем $\frac{p}{l-1}$.

Последовательность $x_n = \lambda^{p/(l-1)} u_n$, где u_n — решение линейного уравнения

$$\begin{aligned}(I - \lambda \Gamma B_1)u_n &= \lambda^{-p/(l-1)} \Gamma_l(\lambda)(R(x_{n-1}, \lambda) + b(\lambda)), \\ u_0 &= 0, n = 1, 2, \dots\end{aligned}$$

сходится к минимальной ветви в окрестности точки $\lambda = 0$.

Доказательство использует разложение пространств E_1, E_2 , лемму Шмидта [2] и работу [6].

СЛЕДСТВИЕ. Пусть в условиях теоремы 2 $\langle B_1 \varphi_i, \psi_u \rangle = \delta_{ik}$, $i, k = 1, \dots, n$, где $\{\varphi_i\}_1^n$ — базис в $N(B_0)$, $\{\psi_i\}_1^n$ — базис в $N(B_0^*)$. Тогда $p = 1$ и последовательность $x_n = \lambda^{1/l-1} u_n$, где

$$\begin{aligned}(B_0 + \sum_1^n \langle \cdot, \gamma_i \rangle z_i - \lambda B_1)u_n &= \lambda^{-\frac{1}{l-1}} (I - \frac{1}{\lambda} \sum_1^n \langle \cdot, \psi_i \rangle z_i)(R(x_{n-1}, \lambda) + b(\lambda)), \\ u_0 &= 0, n = 1, 2, \dots\end{aligned}$$

сходится к минимальной ветви решений.

В дополнение рассмотрим дифференциальный оператор

$$L\left(\frac{d}{dt}\right) = \frac{d}{dt} B_0 - B_1,$$

где B_0 — фредгольмов оператор, $\dim N(B_0) = n \geq 1$. Этот оператор не разрешен относительно производной и в этом смысле сингулярен. Лемма 2 позволяет его регуляризовать. Действительно, по аналогии с леммой 2, при условии IV введем оператор

$$\Gamma_l\left(\frac{d}{dt}\right) = \Gamma - \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{p_i} \frac{d^k}{dt^k} \langle \cdot, \psi_i^{(k)} \rangle \varphi_i^{(1)}.$$

Тогда будет выполнено операторное тождество

$$\Gamma_l\left(\frac{d}{dt}\right)\left(\frac{d}{dt} B_0 - B_1\right) = \frac{d}{dt} - \Gamma B_1,$$

где справа оператор разрешен относительно производной. Поэтому оператор $\Gamma_l\left(\frac{d}{dt}\right)$ естественно назвать левым регуляризатором сингулярного оператора $L\left(\frac{d}{dt}\right)$. Аналогично вводится его правый регуляризатор. Отметим, что в выражении $L\left(\frac{d}{dt}\right)$ вместо оператора дифференцирования мог бы стоять любой другой оператор, перестановочный с B_0 и B_1 . Регуляризаторы $\Gamma_l\left(\frac{d}{dt}\right)$ можно применить при исследовании вырожденных дифференциально — операторных уравнений с вырождением [3, гл. 4], [7]. Полезны они и при решении бифуркационных задач для систем Власова-Максвелла [4].

Н.А. Сидоров

1. *Лаврентьев М.М., Савельев П.Я.* Теория операторов и некорректные задачи // Новосибирск.- Изд-во Ин-та математики.- 1999.
2. *Вайнберг М.М., Треногин В.А.* Теория ветвления решений нелинейных уравнений // М.: Наука.- 1969.
3. *Сидоров Н.А.* Общие вопросы регуляризации в задачах теории ветвления // Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та.- 1982.
4. *Sidorov N., Loginov B. et al.* Lyapunov-Schmidt methods in nonlinear analysis and applications // Dordrecht: Kluwer Academic Publ.- 2002.
5. *Сидоров Н.А.* Известия вузов. Математика. 2001. N 9 (472). С. 59-65.
6. *Сидоров Н.А.* Мат. сборник. 1995. Т. 186. N 2. С. 129-141.
7. *Свиридюк Г.А.* Успехи мат. наук. 1994. Т. 49. N 4. С. 47-74.

Иркутский государственный университет
ул. К. Маркса 1, Иркутск, 664003, Россия
sidorov@math.isu.runnet.ru

Получено 22.08.2003