

## КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ВЫРОЖДЕННЫМ ЯДРОМ

**В. Ф. Журавлев**

*Житомир. нац. агроэкол. ун-т*  
*Украина, 10008, Житомир, бульв. Старый, 7*  
*e-mail: vfz2008@ukr.net*

*We consider boundary-value problems for integral equations with degenerate kernels. By using the pseudo-inverse operator, we find conditions for existence of a unique solution of the integral equation, as well as a representation for this solution. We also find conditions for existence of a solution of the boundary-value problem for this equation and give a representation of this solution. The results are illustrated with examples.*

*Розглянуто крайові задачі для інтегральних рівнянь з виродженим ядром. За допомогою псевдооберненого оператора отримано умови існування та зображення єдиного розв'язку вихідного інтегрального рівняння, а також умови існування та зображення розв'язку крайової задачі для цього рівняння. Результати проілюстровано прикладами.*

Исследование разрешимости и построение решений линейных краевых задач

$$(Lx)(t) = f(t), \quad (1)$$

$$\ell x(\cdot) = \alpha, \quad (2)$$

где  $L$  — линейный ограниченный оператор,  $\ell$  — линейный ограниченный функционал, зависят от разрешимости исходного операторного уравнения (1). Для большого числа краевых задач в случае, когда оператор  $L$  является всюду разрешимым [1], получены условия разрешимости и формулы для представления их решений [2–4]. Однако существует большой круг краевых задач вида (1), (2), у которых оператор  $L$  не является всюду разрешимым. Интегральные уравнения с вырожденным ядром как раз и относятся к такого рода задачам. Интегральный оператор, задающий исходное уравнение, является фредгольмовым [5, 6] с ненулевым ядром. Это значит, что оператор не имеет обратного, а исходное уравнение разрешимо не при любой правой части [1]. Необратимость исходного оператора вносит существенные трудности в исследование таких краевых задач.

Методы обобщенного обращения и псевдообращения фредгольмовых и нетеровых операторов [4, 7] позволяют решить эту задачу. Рассмотрим применение этих методов к задаче о нахождении критерия разрешимости и построении решений нормально разрешимых операторных уравнений и краевых задач для них в случае, когда оператор  $L$  исходного уравнения является фредгольмовым с ненулевым ядром.

**Постановка задачи.** Рассмотрим линейную краевую задачу

$$(Lx)(t) = f(t), \quad t \in [a, b], \quad (3)$$

$$\ell x(\cdot) = \alpha, \tag{4}$$

где  $L : \mathbf{L}_2^n[a, b] \rightarrow \mathbf{L}_2^n[a, b]$  — интегральный оператор Фредгольма второго рода с вырожденным ядром

$$(Lx)(t) \equiv x(t) - \Psi(t) \int_a^b \Phi(s)x(s) ds, \tag{5}$$

$\ell = \text{col}(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_k) : \mathbf{L}_2^n[a, b] \rightarrow \mathbf{R}^k$  —  $k$ -мерный векторный функционал, действующий из пространства суммируемых с квадратом на промежутке  $[a, b]$  функций  $\mathbf{L}_2^n[a, b]$  в  $k$ -мерное векторное пространство  $\mathbf{R}^k$ . Столбцы  $(n \times m)$ -мерной матрицы  $\Psi(t)$ , строки  $(m \times n)$ -мерной матрицы  $\Phi(t)$ , векторы  $x(t)$  и  $f(t)$  принадлежат гильбертову пространству  $\mathbf{L}_2^n[a, b]$ . Ставится задача: найти условия разрешимости и формулы для представления решений операторного уравнения (3) и краевой задачи (3), (4) с помощью псевдообратного оператора  $L^+$  к оператору  $L$ .

**Предварительные сведения.** Известно [5], что интегральный оператор (5) является фредгольмовым ( $\dim N(L) = \dim N(L^*) = s < \infty$ ). Изложим в общем виде один из способов построения оператора, псевдообратного к фредгольмовому, действующего из вещественного гильбертового пространства  $\mathbf{H}_1$  в вещественное гильбертово пространство  $\mathbf{H}_2$ .

Пусть  $(x_1(t), x_2(t)) = \int_a^b x_1^*(t)x_2(t) dt$  — скалярное произведение  $n$ -мерного вектора-столбца  $x_1(t)$  на  $n$ -мерный вектор-столбец  $x_2(t)$  в пространстве  $\mathbf{H}_1$ , где  $*$  — операция транспонирования. Тогда по формуле  $(X(t), x(t)) = \int_a^b X^*(t)x(t) dt$  определим скалярное произведение  $(n \times r)$ -мерной матрицы  $X(t)$  на  $n$ -мерный вектор-столбец  $x(t)$ , результатом которого будет  $r$ -мерный вектор-столбец констант, а по формуле  $(X(t), Y(t)) = \int_a^b X^*(t)Y(t) dt$  — скалярное произведение  $(n \times m)$ -мерной матрицы  $X(t)$  на  $(n \times m)$ -мерную матрицу  $Y(t)$ , результатом которого будет  $(m \times m)$ -мерная постоянная матрица.

Пусть  $\{f_i\}_{i=1}^s$  — базис нуль-пространства  $N(L)$  оператора  $L$ , а  $\{\varphi_j\}_{j=1}^s$  — базис нуль-пространства  $N(L^*)$  оператора  $L^*$ , сопряженного к оператору  $L$ . Из базисных векторов нуль-пространств  $N(L)$  и  $N(L^*)$  составим  $(n \times s)$ -мерные матрицы

$$X(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_s(t)),$$

$$Y(t) = (\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_s(t))^*.$$

По формулам (3.4) [4, с. 62] построим ортопроекторы  $P_{N(L)} : \mathbf{H}_1 \rightarrow N(L)$  и  $P_{N(L^*)} : \mathbf{H}_2 \rightarrow N(L^*)$ :

$$(P_{N(L)}x)(t) = X(t)\alpha^{-1}(X^*(t), x(t))_{\mathbf{H}_1}, \tag{6}$$

$$(P_{N(L^*)}y)(t) = Y(t)\beta^{-1}(Y^*(t), y(t))_{\mathbf{H}_2}, \tag{7}$$

где  $(\cdot, \cdot)_{\mathbf{H}_i}$ ,  $i = 1, 2$ , — скалярное произведение в пространствах  $\mathbf{H}_1$  и  $\mathbf{H}_2$  соответственно,  $\alpha^{-1}$  и  $\beta^{-1}$  — матрицы, обратные к симметрическим матрицам Грама

$$\alpha = (X^*(t), X(t))_{\mathbf{H}_1}, \quad \beta = (Y^*(t), Y(t))_{\mathbf{H}_2}.$$

Если базисы нуль-пространств  $N(L)$  и  $N(L^*)$  ортонормированы, то матрицы  $\alpha$  и  $\beta$  будут единичными.

Введем в рассмотрение операторы

$$\begin{aligned} (\bar{P}_{N(L^*)}x)(t) &= Y(t)\alpha^{-1}(X^*(t), x(t))_{\mathbf{H}_1}, \bar{P}_{N(L^*)} : \mathbf{H}_1 \rightarrow N(L^*), \\ (\bar{P}_{N(L)}y)(t) &= X(t)\beta^{-1}(Y^*(t), y(t))_{\mathbf{H}_2}, \bar{P}_{N(L)} : \mathbf{H}_2 \rightarrow N(L). \end{aligned} \quad (8)$$

Оператор  $\bar{P}_{N(L^*)}$  является расширением на пространство  $\mathbf{H}_1$  оператора, который осуществляет изоморфизм  $N(L)$  на  $N(L^*)$ , а  $\bar{P}_{N(L)}$  — оператор, являющийся расширением оператора, обратного изоморфному, на пространство  $\mathbf{H}_2$ .

**Лемма 1.** Оператор  $\bar{L} = L + \bar{P}_{N(L^*)}$  имеет ограниченный обратный  $\bar{L}^{-1}$ .

Доказательство леммы аналогично приведенному в [4].

С помощью леммы 1 доказывается следующая теорема.

**Теорема 1.** Оператор

$$L^+ = \bar{L}^{-1} - \bar{P}_{N(L)} \quad (9)$$

является ограниченным псевдообратным оператором к ограниченному фредгольмову оператору  $L$ .

Доказательство теоремы сводится к проверке соотношений, определяющих единственный псевдообратный оператор [7].

Формула (9) для представления единственного псевдообратного оператора к фредгольмовому в гильбертовом пространстве позволяет решить задачу об условиях разрешимости и представлении общего решения интегрального уравнения второго рода с вырожденным ядром.

**Критерий разрешимости интегральных уравнений с вырожденным ядром. Псевдообратный оператор к интегральному.** Предположим, что однородное уравнение

$$(Lx)(t) \equiv x(t) - \Psi(t) \int_a^b \Phi(s)x(s) ds = 0 \quad (10)$$

имеет нетривиальные решения, т. е. уравнение (3) не является всюду разрешимым [1]. Найдем условия разрешимости и общий вид решения уравнения (3) при сделанных выше предположениях.

Для построения псевдообратного оператора к интегральному оператору  $L$  построим базисы ядер  $N(L)$  и  $N(L^*)$  операторов  $L$  и  $L^*$  соответственно. Для этого найдем общие решения однородного уравнения (10) и сопряженного ему

$$(L^*y)(t) \equiv y(t) - \Phi^*(t) \int_a^b \Psi^*(s)y(s) ds = 0. \quad (11)$$

Найдем базисы нуль-пространств операторов  $L$  и  $L^*$ . Для этого необходимо решить однородные уравнения (10), (11). Решение этих уравнений будем искать в виде

$$\begin{aligned} x(t) &= \Psi(t) c, \\ y(t) &= \Phi^*(t) d, \end{aligned} \quad (12)$$

где  $c = \text{col}[c_1, c_2, \dots, c_m]$ ,  $d = \text{col}[d_1, d_2, \dots, d_m]$ .

Подставив (12) в (10) и (11) соответственно, получим алгебраические системы относительно  $c$  и  $d$ :

$$\begin{aligned} Dc &= 0, \\ D^*d &= 0, \end{aligned} \quad (13)$$

где  $D = A - E$  ( $D^* = A^* - E$ ),

$$A = \int_a^b \Phi(t)\Psi(t) dt$$

—  $(m \times m)$ -мерная постоянная матрица.

Пусть  $P_{N(D)} : \mathbf{R}^m \rightarrow N(D)$  и  $P_{N(D^*)} : \mathbf{R}^m \rightarrow N(D^*)$  — ортопроекторы [4] на нуль-пространства  $N(D)$  и  $N(D^*)$  матриц  $D$  и  $D^*$  соответственно.

Алгебраические системы (13) имеют ненулевые решения тогда и только тогда, когда  $P_{N(D)} \neq 0$ , что необходимо влечет за собой и  $P_{N(D^*)} \neq 0$ . Эти условия эквивалентны условию  $\det D = 0$ , что мы и предполагаем.

Пусть  $\text{rank } D = m - r$  ( $\text{rank } D^* = m - r$ ). Тогда  $(m \times m)$ -мерные матрицы-ортопроекторы  $P_{N(D)}$  и  $P_{N(D^*)}$  имеют по  $r$  линейно независимых столбцов, из которых составим  $(n \times r)$ -мерные матрицы  $P_{N_r(D)}$  и  $P_{N_r(D^*)}$  соответственно.

С помощью этих матриц общие решения систем (13) можно представить в виде [4]

$$\begin{aligned} c &= P_{N_r(D)} c_r, \\ d &= P_{N_r(D^*)} d_r, \end{aligned} \quad (14)$$

где  $c_r \in \mathbf{R}^r$  и  $d_r \in \mathbf{R}^r$  — произвольные  $r$ -мерные постоянные векторы.

Подставив (14) в (12), получим общие решения однородных интегральных уравнений (10) и (11)

$$x(t) = X_r(t)c_r,$$

$$y(t) = Y_r(t)d_r,$$

где  $X_r(t) = \Psi(t)P_{N_r(D)}$  и  $Y_r(t) = \Phi^*(t)P_{N_r(D^*)}$  —  $(n \times r)$ -мерные фундаментальные матрицы, столбцы которых составляют базисы нуль-пространств  $N(L)$  и  $N(L^*)$  операторов  $L$  и  $L^*$ .

По формулам (7), (8) построим ортопроектор  $P_{N(L^*)}$ , операторы  $\bar{P}_{N(L)}$  и  $\bar{P}_{N(L^*)}$  :

$$(P_{N(L^*)}y)(t) = Y_r(t)\beta^{-1} \int_a^b Y_r^*(s)y(s) ds, \quad P_{N(L^*)} : \mathbf{L}_2^n[a, b] \rightarrow N(L^*),$$

$$(\bar{P}_{N(L^*)}x)(t) = Y_r(t)\alpha^{-1} \int_a^b X_r^*(s)x(s) ds, \quad \bar{P}_{N(L^*)} : \mathbf{L}_2^n[a, b] \rightarrow N(L^*),$$

$$(\bar{P}_{N(L)}y)(t) = X_r(t)\beta^{-1} \int_a^b Y_r^*(s)y(s) ds, \quad \bar{P}_{N(L)} : \mathbf{L}_2^n[a, b] \rightarrow N(L).$$

Здесь  $\alpha^{-1}$  и  $\beta^{-1}$  — матрицы, обратные к  $(r \times r)$ -мерным симметрическим матрицам Грама

$$\alpha = \int_a^b X_r^*(t)X_r(t) dt, \quad \beta = \int_a^b Y_r^*(t)Y_r(t) dt.$$

Тогда по лемме 1 оператор

$$(L + \bar{P}_{N(L^*)})x(t) \equiv x(t) - \Psi(t) \int_a^b \Phi(s)x(s) ds + Y_r(t)\beta^{-1} \int_a^b X_r^*(s)x(s) ds$$

имеет ограниченный обратный, т. е. интегральное уравнение

$$[(L + \bar{P}_{N(L^*)})x](t) = f(t) \tag{15}$$

разрешимо при любой правой части.

Для нахождения решения этого уравнения запишем (15) в виде

$$(\bar{L}x)(t) = [(L + \bar{P}_{N(L^*)})x](t) \equiv x(t) - \Psi_1(t) \int_a^b \Phi_1^*(s)x(s) ds = f(t), \tag{16}$$

где  $\Psi_1(t) = [\Psi(t), -Y_r(t)\alpha^{-1}]$  —  $(n \times (m + r))$ -мерная матрица, составленная из матриц  $\Psi(t)$  и  $-Y_r(t)\alpha^{-1}$ , а  $\Phi_1(t) = [\Phi^*(t), X_r(t)]$  —  $(n \times (m + r))$ -мерная матрица, составленная из матриц  $\Phi(t)$  и  $X_r^*(t)$ .

Следуя [5], решение уравнения (16) можно записать в виде

$$x(t) = ((L + \bar{P}_{N(L^*)}f)(t) \equiv f(t) + \Psi_1(t)M^{-1} \int_a^b \Phi_1^*(s)f(s) ds, \quad (17)$$

где  $M^{-1} - ((m + r) \times (m + r))$ -мерная матрица, обратная к матрице  $M = I - B$ ,

$$B = \int_a^b \Phi_1^*(t)\Psi_1(t) dt.$$

Тогда согласно теореме 1 оператор, псевдообратный к оператору  $L$ , будет иметь вид

$$\begin{aligned} (L^+ f)(t) &= ((L + \bar{P}_{N(L^*)})^{-1} - \bar{P}_{N(L)})f(t) = \\ &= f(t) + \Psi_1(t)M^{-1} \int_a^b \Phi_1^*(s)f(s) ds - X_r(t)\beta^{-1} \int_a^b Y_r^*(s)f(s) ds. \end{aligned} \quad (18)$$

Используя свойства построенного псевдообратного оператора  $L^+$  и тот факт, что ортопроекторы  $P_{N(L)}$  и  $P_{N(L^*)}$  индуцируют разбиение гильбертова пространства  $\mathbf{L}_2^n[a, b]$  в прямые суммы взаимно ортогональных подпространств  $\mathbf{L}_2^n[a, b] = N(L) \oplus R(L^*)$ ,  $\mathbf{L}_2^n[a, b] = N(L^*) \oplus R(L)$ , легко доказать следующее утверждение.

**Теорема 2.** Пусть  $\text{rank } D = m - r, r \neq 0$ . Тогда интегральное уравнение Фредгольма с вырожденным ядром (3) разрешимо для тех и только тех  $f(t) \in \mathbf{L}_2^n[a, b]$ , для которых

$$(P_{N(L^*)}f)(t) = Y_r(t)\beta^{-1} \int_a^b Y_r^*(s)f(s) ds = 0, \quad (19)$$

и при этом имеет  $r$ -параметрическое семейство решений вида

$$x(t) = X_r(t)c_r + (L^+ f)(t), \quad (20)$$

первое слагаемое в котором есть общее решение соответствующего однородного уравнения, а второе слагаемое  $(L^+ f)(t)$  — единственное частное решение (18) уравнения (3), ортогональное к любому решению однородного уравнения (10),  $c_r \in \mathbf{R}^r$  — произвольный  $r$ -мерный вектор-столбец констант.

Решения уравнения (3), если они существуют, в дальнейшем будем записывать в виде

$$x(t) = X_r(t)c_r + f(t) + \Psi_2(t) \int_a^b \Phi_2^*(s)f(s) ds, \quad (21)$$

где  $\Psi_2(t) = [\Psi_1(t)M^{-1}, -X_r(t)\beta^{-1}]$  —  $(n \times (m + 2r))$ -мерная матрица, составленная из матриц  $\Psi_1(t)M^{-1}$  и  $X_r(t)\beta^{-1}$ ,  $\Phi_2(t) = [\Phi_1(t), Y_r(t)]$  —  $(n \times (m + 2r))$ -мерная матрица, составленная из матриц  $\Phi_1(t)$  и  $Y_r(t)$ .

Условие разрешимости (19) вследствие линейной независимости столбцов матрицы  $Y_r(t)\beta^{-1}$  эквивалентно условию

$$\int_a^b Y_r^*(s)f(s) ds = 0.$$

**Линейные краевые задачи для интегральных уравнений второго рода с вырожденным ядром.** Найдем решения уравнения (3), удовлетворяющие краевым условиям (4).

Задачу (3), (4) будем рассматривать в предположении, что соответствующая однородная краевая задача

$$\begin{aligned} (Lx)(t) &= 0, \\ \ell x(\cdot) &= 0 \end{aligned} \tag{22}$$

имеет нетривиальные решения. В условиях теоремы 2 для того чтобы уравнение (3) имело решения, удовлетворяющие условиям (4), необходимо и достаточно, чтобы алгебраическая система

$$Qc_r = \alpha - \ell \left\{ f(\cdot) + \Psi_2(\cdot) \int_a^b \Phi_2^*(s)f(s) ds \right\}, \tag{23}$$

которая получается подстановкой решения (21) интегрального уравнения (3) в краевые условия (4), была разрешима относительно  $c_r$ . Здесь  $Q = \ell X_r(\cdot) - (k \times r)$ -мерная постоянная матрица.

Пусть  $Q^+$  — единственная  $(r \times k)$ -мерная псевдообратная матрица [4, 7] к матрице  $Q$ ,  $P_{N(Q)} : \mathbf{R}^r \rightarrow N(Q)$  —  $(r \times r)$ -мерная матрица-ортопроектор;  $P_{N(Q^*)} : \mathbf{R}^k \rightarrow N(Q^*)$  —  $(k \times k)$ -мерная матрица-ортопроектор.

Обозначим через  $P_{N_\rho(Q)}$   $(k \times \rho)$ -мерную матрицу, столбцы которой —  $\rho$  линейно независимые столбцы матрицы  $P_{N(Q)}$  ( $\rho = k - n_1, n_1 = \text{rank } Q$ );  $P_{N_d(Q^*)}$  —  $(d \times r)$ -мерная матрица, строки которой —  $d$  линейно независимые строки матрицы  $P_{N(Q^*)}$  ( $d = r - n_1$ ).

Алгебраическая система (23) разрешима тогда и только тогда, когда выполнено условие [2, 4]

$$P_{N_d(Q^*)} \left\{ \alpha - \ell \left[ f(\cdot) + \Psi_2(\cdot) \int_a^b \Phi_2^*(s)f(s) ds \right] \right\} = 0$$

и при этом имеет  $\rho$ -параметрическое семейство решений

$$c_r = P_{N_\rho(Q)}c_\rho - Q^+ \left\{ \alpha - \ell \left[ f(\cdot) + \Psi_2(\cdot) \int_a^b \Phi_2^*(s)f(s) ds \right] \right\}, \quad c_\rho \in \mathbf{R}^\rho. \tag{24}$$

Подставив (24) в общее решение (21) уравнения (3), получим общее решение краевой задачи (3), (4):

$$\begin{aligned} x(t) &= X_r(t)P_{N_\rho(Q)}c_\rho + X_r(t)Q^+\alpha - X_r(t)Q^+\ell \left[ f(\cdot) + \Psi_2(\cdot) \int_a^b \Phi_2^*(s)f(s) ds \right] + f(t) + \\ &+ \Psi_2(t) \int_a^b \Phi_2^*(s)f(s) ds = X_\rho(t)c_\rho + f(t) + \\ &+ X_r(t)Q^+[\alpha - \ell f(\cdot)] + [\Psi_2(t) - X_r(t)Q^+\ell\Psi_2(\cdot)] \int_a^b \Phi_2^*(s)f(s) ds. \end{aligned}$$

Таким образом, справедливо следующее утверждение.

**Теорема 3.** Пусть  $\text{rank } Q = n_1 \leq \min(k, r)$ . Тогда соответствующая (3), (4) однородная краевая задача (22) ( $f(t) = 0$ ) имеет  $\rho = r - n_1$  и только  $\rho$  линейно независимых решений.

Неоднородная краевая задача (3), (4) разрешима для тех и только тех  $f(t)$  и  $\alpha$ , которые удовлетворяют  $r + d$  линейно независимым условиям

$$\int_a^b Y_r^*(s)f(s) ds = 0,$$

$$P_{N_d(Q^*)} \left\{ \alpha - \ell \left[ f(\cdot) + \Psi_2(\cdot) \int_a^b \Phi_2^*(s)f(s) ds \right] \right\} = 0,$$

и при этом имеет  $\rho$ -параметрическое семейство решений

$$x(t) = X_\rho(t)c_\rho + \bar{f}(t) + \bar{\Psi}_2(t) \int_a^b \Phi_2^*(s)f(s) ds,$$

где  $X_\rho(t) = X_r(t)P_{N_\rho(Q)} - (n \times \rho)$ -мерная фундаментальная матрица краевой задачи (3), (4);  $\bar{f}(t) = f(t) - X_r(t)Q^+\ell f(\cdot)$ ;  $\bar{\Psi}_2(t) = \Psi_2(t) - X_r(t)Q^+\ell\Psi_2(\cdot)$ .

Пусть  $\text{rank } Q = r$ . Тогда необходимо выполнение неравенства  $k \leq r$ . В этом случае краевая задача (3), (4) переопределена и для нее имеет место следующая теорема.

**Теорема 4.** Пусть  $\text{rank } Q = r$ . Тогда соответствующая (3), (4) однородная краевая задача (22) не имеет решений, кроме тривиального.

Неоднородная краевая задача (3), (4) разрешима для тех и только тех  $f(t)$  и  $\alpha$ , которые удовлетворяют  $r + d$  линейно независимым условиям

$$\int_a^b Y_r^*(s)f(s) ds = 0,$$



$$P_{N_d(Q^*)} \left\{ \alpha - \ell \left[ f(\cdot) + \Psi_2(\cdot) \int_a^b \Phi_2^*(s) f(s) ds \right] \right\} = 0, \quad d = k - r,$$

и при этом имеет единственное решение

$$x(t) = \bar{f}(t) + \bar{\Psi}_2(t) \int_a^b \Phi_2^*(s) f(s) ds,$$

где  $\bar{f}(t) = f(t) - X_r(t)Q^+ \ell f(\cdot)$ ,  $\bar{\Psi}_2(t) = \Psi_2(t) - X_r(t)Q^+ \ell \Psi_2(\cdot)$ .

Действительно, так как  $\text{rank } Q = r$ , то  $P_{N(Q)} = P_{N_\rho(Q)} = 0$ ,  $X_\rho(t) = X_r(t)P_{N_\rho(Q)} \equiv 0$  и из теоремы 3 следует утверждение теоремы 4.

Пусть  $\text{rank } Q = k$ . Тогда  $k \geq r$ . В этом случае краевая задача (3), (4) недоопределена и для нее имеет место следующая теорема.

**Теорема 5.** Пусть  $\text{rank } Q = k$ . Тогда соответствующая (3), (4) однородная краевая задача (22) имеет  $\rho = r - k$  и только  $\rho$  линейно независимых решений.

Неоднородная краевая задача (3), (4) разрешима для тех и только тех  $f(t)$ , которые удовлетворяют  $r$  линейно независимым условиям

$$\int_a^b Y_r^*(s) f(s) ds = 0,$$

и при этом имеет  $\rho$ -параметрическое семейство решений

$$x(t) = X_\rho(t)c_\rho + \bar{f}(t) + \bar{\Psi}_2(t) \int_a^b \Phi_2^*(s) f(s) ds,$$

где  $X_\rho(t) = X_r(t)P_{N_\rho(Q)} - (n \times \rho)$ -мерная фундаментальная матрица,  $\bar{f}(t) = f(t) - X_r(t)Q^+ \ell f(\cdot)$ ,  $\bar{\Psi}_2(t) = \Psi_2(t) - X_r(t)Q^+ \ell \Psi_2(\cdot)$ .

Поскольку  $\text{rank } Q = k$ , то  $P_{N(Q^*)} = P_{N_d(Q^*)} = 0$ , и из теоремы 3 следует утверждение теоремы 5.

В случае периодической краевой задачи (3), (4) справедливо следующее утверждение.

**Теорема 6.** Пусть элементы вектора-столбца  $f(t)$  и матриц  $\Phi(t)$ ,  $\Psi(t)$  являются периодическими по  $T$  функциями и  $\text{rank } Q = n_1 \leq \min(k, r)$ . Тогда соответствующая (3), (4) однородная краевая задача имеет  $\rho = r - n_1$  и только  $\rho$  линейно независимых периодических решений.

Неоднородная краевая задача (3), (4) имеет периодические решения для тех и только тех  $f(t)$ , которые удовлетворяют условиям

$$\int_0^T Y_r^*(s) f(s) ds = 0,$$

$$P_{N_d(Q^*)} \left\{ f(0) - f(T) + [\Psi_2(0) - \Psi_2(T)] \int_0^T \Phi_2^*(s) f(s) ds \right\} = 0,$$

и при этом имеет  $\rho$ -параметрическое семейство периодических решений

$$x(t) = X_\rho(t) c_\rho + \bar{f}(t) + \bar{\Psi}_2(t) \int_0^T \Phi_2^*(s) f(s) ds,$$

где  $X_\rho(t) = X_r(t) P_{N_\rho(Q)}$  —  $(n \times \rho)$ -мерная фундаментальная матрица,  $\bar{f}(t) = f(t) - X_r(t) Q^+ [f(0) - f(T)]$ ,  $\bar{\Psi}_2(t) = \Psi_2(t) - X_r(t) Q^+ [\Psi_2(0) - \Psi_2(T)]$ .

**Пример 1.** В качестве иллюстрации предложенного выше алгоритма построения решений линейных краевых задач для интегральных уравнений Фредгольма второго рода рассмотрим краевую задачу

$$(Lx)(t) = x(t) - \begin{pmatrix} 0 & 0 & t-1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \int_0^2 \begin{pmatrix} 0 & s - \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \\ \frac{3s}{2} & 0 \end{pmatrix} x(s) ds = f(t), \quad (25)$$

$$\ell x(\cdot) = x(0) - x(2) = 0, \quad (26)$$

где  $x(t) = \text{col}(x_1(t), x_2(t))$  и  $f(t) = \text{col}(f_1(t), f_2(t))$  принадлежат пространству  $\mathbf{L}_2^2[0, 2]$ ,  $t \in [0, 2]$ .

Оператор  $L^*$ , сопряженный оператору  $L$ , имеет вид

$$(L^*y)(t) = y(t) - \begin{pmatrix} 0 & 1 & \frac{3t}{2} \\ t - \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \int_0^2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ s - 1 & 0 \end{pmatrix} y(s) ds.$$

Найдем базисы ядер  $\ker L$  и  $\ker L^*$  операторов  $L$  и  $L^*$ . Для этого решим однородные уравнения

$$(Lx)(t) = 0, \quad (27)$$

$$(L^*y)(t) = 0.$$

Решения будем искать в виде

$$x(t) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & t-1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} c, \quad (28)$$

$$y(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \frac{3t}{2} \\ t - \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} d.$$

Подставив (28) в (27), получим относительно  $c \in \mathbf{R}^3$  и  $d \in \mathbf{R}^3$  алгебраические системы

$$\begin{aligned}(E - A)c &= 0, \\ (E - A^*)d &= 0,\end{aligned}\tag{29}$$

где

$$A = \int_0^2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ t-1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \frac{3t}{2} \\ t - \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} dt = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Тогда } D = D^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, P_{N(D)} = P_{N(D^*)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Поскольку  $\text{rank } D = 1$ ,  $r = 2$  и  $P_{N_r(D)} = P_{N_r(D^*)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ , решения алгебраических уравнений (29) будут иметь вид

$$c = P_{N_r(D)}c_r, \quad c_r \in \mathbf{R}^2,$$

$$d = P_{N_r(D^*)}d_r, \quad d_r \in \mathbf{R}^2.$$

Соответственно, общие решения уравнений (27) запишутся следующим образом:

$$x(t) = X_r(t)c_r = \begin{pmatrix} 0 & t-1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} c_r,$$

$$y(t) = Y_r(t)d_r = \begin{pmatrix} 0 & \frac{3t}{2} \\ t - \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} d_r,$$

где

$$X_r(t) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & t-1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} P_{N_r(D)}, \quad Y_r(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \frac{3t}{2} \\ t - \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} P_{N_r(D^*)}.$$

Таким образом, столбцы матриц  $X_r(t)$  и  $Y_r(t)$  составляют базисы соответственно нуль-пространств  $N(L)$  и  $N(L^*)$  операторов  $L$  и  $L^*$ .

По формулам (7), (8) построим операторы

$$(P_{N(L^*)}y)(t) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{t}{4} \\ \frac{6t-3}{7} & 0 \end{pmatrix} \int_0^2 \begin{pmatrix} 0 & s - \frac{1}{2} \\ \frac{3s}{2} & 0 \end{pmatrix} y(s) ds,$$

$$(\bar{P}_{N(L^*)}x)(t) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{9t}{4} \\ \frac{2t-1}{4} & 0 \end{pmatrix} \int_0^2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ s-1 & 0 \end{pmatrix} x(s) ds,$$

$$(\bar{P}_{N(L)}y)(t) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{t-1}{6} \\ \frac{6}{7} & 0 \end{pmatrix} \int_0^2 \begin{pmatrix} 0 & s-\frac{1}{2} \\ \frac{3s}{2} & 0 \end{pmatrix} y(s) ds.$$

Оператор  $(\bar{L}x)(t) = (L + \bar{P}_{N(L^*)})x(t)$  будет иметь вид

$$(\bar{L}x)(t) = x(t) - \begin{pmatrix} 0 & 0 & t-1 & 0 & \frac{9t}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{-2t+1}{4} & 0 \end{pmatrix} \int_0^2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & \frac{3s}{2} & 0 & s-1 \\ s-\frac{1}{2} & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^* x(s) ds.$$

По формуле (17) построим оператор  $\bar{L}^{-1}$ , обратный к оператору  $\bar{L}$  :

$$(\bar{L}^{-1}f)(t) = f(t) - \begin{pmatrix} 0 & 0 & t-1 & 0 & \frac{9t}{4} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{-2t+1}{4} & 0 \end{pmatrix} M^{-1} \times \\ \times \int_0^2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & \frac{3s}{2} & 0 & s-1 \\ s-\frac{1}{2} & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^* f(s) ds,$$

где  $M^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{9}{23} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{12} & 0 & -\frac{3}{2} \\ \frac{12}{23} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{9} & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

Тогда, следуя (18), оператор  $L^+$  запишем в виде

$$\begin{aligned} (L^+f)(t) &= ((\bar{L}^{-1} - \bar{P}_{N(L)})f)(t) = \\ &= f(t) - \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{-2t+5}{12} & 0 & \frac{-3(t-1)}{2} & 0 & \frac{1-t}{6} \\ \frac{-6(t-2)}{23} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{-6}{7} & 0 \end{pmatrix} \times \\ &\times \int_0^2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & \frac{3s}{2} & 0 & s-1 & 0 & \frac{3s}{2} \\ \frac{s-1}{2} & 0 & 0 & 1 & 0 & s-\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}^* f(s) ds. \end{aligned} \quad (30)$$

При условии

$$(P_{N(L^*)}f)(t) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{t}{4} \\ \frac{6t-3}{7} & 0 \end{pmatrix} \int_0^2 \begin{pmatrix} 0 & \frac{s-1}{2} \\ \frac{3s}{2} & 0 \end{pmatrix} f(s) ds = 0 \quad (31)$$

общее решение уравнения (25) таково:

$$x(t) = X_r(t)c_r + (L^+f)(t) = \begin{pmatrix} 0 & t-1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} c_r + (L^+f)(t), \quad c_r \in \mathbf{R}^2,$$

где  $(L^+f)(t)$  имеет представление (30).

С учетом того, что  $f(t) = \text{col}(f_1(t), f_2(t))$ , условие (31) можно записать в более простом виде

$$\int_0^2 \begin{pmatrix} 0 & \frac{s-1}{2} \\ \frac{3s}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1(s) \\ f_2(s) \end{pmatrix} ds = \int_0^2 \begin{pmatrix} \frac{s-1}{2} f_2(s) \\ \frac{3s}{2} f_1(s) \end{pmatrix} ds = 0.$$

Найдем теперь условия разрешимости и общий вид решения краевой задачи (23), (25).

Подставив общее решение интегрального уравнения (25) в краевые условия (26), получим алгебраическое уравнение

$$Qc_r = -(L^+f)(0) + (L^+f)(2) \quad (32)$$

для определения константы  $c_r$ .

Для этой задачи имеем

$$Q = X_r(0) - X_r(2) = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q^+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix},$$

$$P_{N(Q)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_{N(Q^*)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Поскольку  $\text{rank } Q = 1$ , а  $\rho = 1$ , то  $P_{N_\rho(Q)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $P_{N_\rho(Q^*)} = (0 \ 1)$ . Уравнение (32) разрешимо при выполнении условия

$$P_{N_\rho(Q^*)}\{f(0) - f(2) + (L^+f)(0) - (L^+f)(2)\} = 0,$$

которое с учетом того, что  $P_{N_\rho(Q^*)} = (0 \ 1)$ ,  $f(t) = \text{col}(f_1(t), f_2(t))$ , примет вид

$$(0 \ 1) \left\{ \begin{pmatrix} f_1(0) \\ f_2(0) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} f_1(2) \\ f_2(2) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 3 & 0 & 0 \\ \frac{12}{23} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \right. \\ \left. \times \int_0^2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & \frac{3s}{2} & 0 & s-1 & 0 & \frac{3s}{2} \\ \frac{s-1}{2} & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} f_1(s) \\ f_2(s) \end{pmatrix} ds \right\} = 0.$$

После преобразований получим

$$f_2(0) - f_2(2) + \frac{6}{23} \int_0^2 (s-1)f_2(s) ds. \tag{33}$$

При выполнении условия (33) уравнение (32) имеет решение вида

$$c_r = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} c_\rho - Q^+ \left\{ f(0) - f(2) + \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 3 & 0 & 0 \\ \frac{12}{23} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \right. \\ \left. \times \int_0^2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & \frac{3s}{2} & 0 & s-1 & 0 & \frac{3s}{2} \\ \frac{s-1}{2} & 0 & 0 & 1 & 0 & s-\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}^* f(s) ds \right\}, \quad c_\rho \in \mathbf{R}^1.$$

Таким образом, задача (25), (26) разрешима при выполнении условий (31) и (33) имеет

общее решение вида

$$\begin{aligned}
 x(t) = & \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} c_\rho + \begin{pmatrix} \frac{1-t}{2} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \{f(0) - f(2)\} + f(t) + \\
 & + \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & \frac{1-t}{6} \\ \frac{6(2-t)}{23} & 0 & 0 & 0 & \frac{3(1-t)}{2} & \frac{-6}{7} & 0 \end{pmatrix} \times \\
 & \times \int_0^2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & \frac{3s}{2} & 0 & s-1 & 0 & \frac{3s}{2} \\ \frac{s-1}{2} & 0 & 0 & 1 & 0 & s-\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}^* f(s) ds.
 \end{aligned}$$

**Пример 2.** Рассмотрим краевую задачу для уравнения (25) с краевыми условиями

$$\ell x(\cdot) = \int_0^2 \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{3t}{2} & 0 \\ 0 & \frac{t}{2} \end{pmatrix} x(t) dt = \alpha. \quad (34)$$

Краевая задача (25), (34) переопределена. Решение будем искать, используя теорему 4.

Подставив решение уравнения (25) в краевые условия (34), получим алгебраическое уравнение относительно  $c_r$  :

$$\begin{aligned}
 Qc_r = & \alpha - \ell L^+ f(\cdot) = \alpha - \int_0^2 \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{3s}{2} & 0 \\ 0 & \frac{s}{2} \end{pmatrix} f(s) ds - \\
 & - \Psi_2 \int_0^2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & \frac{3s}{2} & 0 & s-1 & 0 & \frac{3s}{2} \\ \frac{s-1}{2} & 0 & 0 & 1 & 0 & s-\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}^* f(s) ds, \quad (35)
 \end{aligned}$$

где

$$Q = \ell X_r(\cdot) = \int_0^2 \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{3t}{2} & 0 \\ 0 & \frac{t}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & t-1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} dt,$$

$$\begin{aligned} \Psi_2 = \ell \Psi_2(\cdot) &= \int_0^2 \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{3t}{2} & 0 \\ 0 & \frac{t}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{-2t+5}{12} & 0 & \frac{-3(t-1)}{2} & 0 & \frac{1-t}{6} \\ \frac{-6(t-2)}{23} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{-6}{7} & 0 \end{pmatrix} dt = \\ &= \begin{pmatrix} \frac{6}{23} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{6}{7} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{7}{12} & 0 & -\frac{3}{2} & 0 & -\frac{2}{3} \\ -\frac{4}{23} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{6}{7} & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Для данной краевой задачи имеем

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q^+ = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$P_{N(Q)} = 0, \quad P_{N(Q^*)} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Поскольку  $\text{rank } Q = 2$ , а  $\rho = 2$ , то  $P_{N_\rho(Q)} = 0$ ,  $P_{N_d(Q^*)} = \frac{1}{2} (1 \ 0 \ -1)$ . Уравнение (35) разрешимо при выполнении условия

$$P_{N_d(Q^*)} \left\{ \alpha - \ell \left[ f(\cdot) + \Psi_2(\cdot) \int_0^2 \Phi_2^*(s) f(s) ds \right] \right\} = 0,$$

которое с учетом того, что  $P_{N_d(Q^*)} = \frac{1}{2} (1 \ 0 \ -1)$ ,  $f(t) = \text{col}(f_1(t), f_2(t))$ ,  $\alpha =$



$= \text{col}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ , примет вид

$$\begin{aligned} (1 \ 0 \ -1) & \left\{ \begin{aligned} & \left( \begin{array}{c} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{array} \right) - \int_0^2 \left( \begin{array}{cc} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{3s}{2} & 0 \\ 0 & \frac{s}{2} \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} f_1(s) \\ f_2(s) \end{array} \right) ds - \\ & - \left( \begin{array}{ccccccc} \frac{6}{23} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{6}{7} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{7}{12} & 0 & -\frac{3}{2} & 0 & -\frac{2}{3} \\ -\frac{4}{23} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{6}{7} & 0 \end{array} \right) \times \\ & \times \int_0^2 \left( \begin{array}{cccccc} 0 & 1 & \frac{3s}{2} & 0 & s-1 & 0 & \frac{3s}{2} \\ \frac{s-1}{2} & 0 & 0 & 1 & 0 & s-\frac{1}{2} & 0 \end{array} \right)^* \left( \begin{array}{c} f_1(s) \\ f_2(s) \end{array} \right) ds \end{aligned} \right\} = 0. \end{aligned}$$

После преобразований получим

$$\alpha_1 - \alpha_3 + \frac{13}{46} \int_0^2 (s-1) f_2(s) ds = 0. \quad (36)$$

При выполнении условия (36) уравнение (35) имеет единственное решение вида

$$\begin{aligned} c_r = Q^+ & \left\{ \begin{aligned} & \alpha - \int_0^2 \left( \begin{array}{cc} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{3s}{2} & 0 \\ 0 & \frac{s}{2} \end{array} \right) f(s) ds - \\ & - \Psi_2 \int_0^2 \left( \begin{array}{cccccc} 0 & 1 & \frac{3s}{2} & 0 & s-1 & 0 & \frac{3s}{2} \\ \frac{s-1}{2} & 0 & 0 & 1 & 0 & s-\frac{1}{2} & 0 \end{array} \right)^* f(s) ds \end{aligned} \right\}. \end{aligned}$$

Таким образом, краевая задача (25), (34) разрешима при выполнении условий (31) и (36) имеет единственное решение вида

$$\begin{aligned} x(t) = \left( \begin{array}{ccc} 0 & t-1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{array} \right) & \left\{ \begin{aligned} & \alpha - \int_0^2 \left( \begin{array}{cc} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{3s}{2} & 0 \\ 0 & \frac{s}{2} \end{array} \right) f(s) ds - \\ & - \Psi_2 \int_0^2 \left( \begin{array}{cccccc} 0 & 1 & \frac{3s}{2} & 0 & s-1 & 0 & \frac{3s}{2} \\ \frac{s-1}{2} & 0 & 0 & 1 & 0 & s-\frac{1}{2} & 0 \end{array} \right)^* f(s) ds \end{aligned} \right\} + (L^+ f)(t). \end{aligned}$$

**Пример 3.** Рассмотрим краевую задачу для уравнения (25) с краевыми условиями

$$\ell x(\cdot) = \begin{pmatrix} -1 & 2 \end{pmatrix} x(0) + \begin{pmatrix} 1 & -2 \end{pmatrix} x(2) = \alpha, \quad \alpha \in \mathbf{R}^1. \quad (37)$$

Краевая задача (25), (37) недоопределена. Решение будем искать, используя теорему 5.

Подставив решение уравнения (25) в краевые условия (37), получим алгебраическое уравнение относительно  $c_r$  :

$$Qc_r = \alpha - \ell L^+ f(\cdot) = \alpha - \bar{f} - \bar{\Psi}_2 \int_0^2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & \frac{3s}{2} & 0 & s-1 & 0 & \frac{3s}{2} \\ \frac{s-1}{2} & 0 & 0 & 1 & 0 & s-\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}^* f(s) ds, \quad (38)$$

где

$$Q = \ell X_r(\cdot) = \begin{pmatrix} -1 & 2 \end{pmatrix} X_r(0) + \begin{pmatrix} 1 & -2 \end{pmatrix} X_r(2) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\bar{f} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \end{pmatrix} f(0) + \begin{pmatrix} 1 & -2 \end{pmatrix} f(2),$$

$$\bar{\Psi}_2 = \ell \Psi_2(\cdot) = \begin{pmatrix} -1 & 2 \end{pmatrix} \Psi(0) + \begin{pmatrix} 1 & -2 \end{pmatrix} \Psi(2) = \begin{pmatrix} \frac{24}{23} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & -3 & -\frac{24}{7} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Для данной краевой задачи имеем

$$Q^+ = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad P_{N(Q)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_{N(Q^*)} = 0.$$

Поскольку  $\text{rank } Q = 1, \rho = 1, d = 0$ , то  $P_{N_\rho(Q)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, P_{N_d(Q^*)} = 0$ .

Так как  $P_{N_d(Q^*)} = 0$ , уравнение (38) разрешимо при любой правой части и имеет однопараметрическое ( $c_\rho \in \mathbf{R}^1$ ) семейство решений вида

$$c_r = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} c_\rho + Q^+ \left\{ \alpha - \bar{f} - \bar{\Psi}_2 \int_0^2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & \frac{3s}{2} & 0 & s-1 & 0 & \frac{3s}{2} \\ \frac{s-1}{2} & 0 & 0 & 1 & 0 & s-\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}^* f(s) ds \right\}.$$

Таким образом, краевая задача (25), (37) разрешима при выполнении условия (31) и имеет

общее решение вида

$$x(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} c_p + \begin{pmatrix} \frac{t-1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \times$$

$$\times \left\{ \alpha - \bar{f} - \bar{\Psi}_2 \int_0^2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & \frac{3s}{2} & 0 & s-1 & 0 & \frac{3s}{2} \\ \frac{s-1}{2} & 0 & 0 & 1 & 0 & s-\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}^* f(s) ds \right\} + (L^+ f)(t).$$

1. Крейн С. Г. Линейные уравнения в банаховом пространстве. — М.: Наука, 1971. — 104 с.
2. Бойчук А. А. Конструктивные методы анализа краевых задач. — Киев: Наук. думка, 1990. — 96 с.
3. Бойчук А. А., Журавлев В. Ф. Построение решений краевых задач для дифференциальных систем с запаздыванием в критических случаях // Докл. АН УССР. Сер. А. — 1990. — № 6. — С. 3–6.
4. Бойчук А. А., Журавлев В. Ф., Самойленко А. М. Обобщенно-обратные операторы и нетеровы краевые задачи. — Киев: Ин-т математики НАН Украины, 1995. — 320 с.
5. Владимиров В. С. Уравнения математической физики. — М.: Наука, 1988. — 512 с.
6. Samoilenko A. M., Boichuk A. A., Krivosheya S. A. Boundary-value problem for linear systems of integro-differential equations with degenerate kernel // Ukr. Mat. Zh. — 1996. — **48**, № 11. — S. 1576–1579.
7. Boichuk A. A., Samoilenko A. M. Generalised inverse operators and Fredholm boundary-value problems. — Utrecht; Boston: VSP, 2004. — 317 p.

Получено 30.03.10