

НОВЫЙ ВИД ГИМЕНОЛЕПИДИД ТРАВНИКА — *WARDIUM SMOGORJEVSKAJAE* SP. N. (CESTODA, CYCLOPHYLLIDEA)

В. В. Корнюшин, А. А. Спасский

(Институт зоологии АН УССР, Институт зоологии АН МССР)

При изучении цестод куликов черноморского побережья нами был обработан материал, собранный при полных гельминтологических вскрытиях 60 особей травника *Tringa totanus* L., гнездящихся на побережье Тендровского залива. Они были в значительной степени заражены цестодами, которые, судя по их морфологии, принадлежат к роду *Wardium* Mayhew, 1925, sensu Spassky et Spasskaja, 1954. В работах зарубежных авторов этот род не находит признания и числится в синонимах других родов гименолепидид. Одни авторы включают его в род *Hymenolepis*, другие — в род *Dicranotaenia*, третые относят к подроду *Hymenolepis* рода *Hymenolepis* Weinland.

Ни одно из этих решений не выдерживает критики: род *Hymenolepis* целиком состоит из гельминтов млекопитающих (грызуны, приматы), заражающихся гименолепидозами при поедании сухопутных насекомых; род *Dicranotaenia* объединяет цестод водоплавающих птиц, но для его представителей характерно наличие внутреннего добавочного мешочка (*sacculus accessorius int.*) и целого комплекса других своеобразных анатомических признаков.

Мы считаем *Wardium* самостоятельным родом, который (в половозрелой стадии) гораздо ближе к родам *Limnolepis* Spassky et Spasskaja, 1954, и *Aploparaksis* Clege, 1903, чем к родам *Hymenolepis* и *Dicranotaenia*.

Детальное изучение обнаруженных цепней и сравнение их с имеющимися в литературе описаниями показало, что они являются представителями нового вида. Этот вид мы называем именем украинского гельминтолога Л. А. Смогоржевской, собравшей часть обработанной нами коллекции.

Wardium smogorjevskajae Korniushin et Spassky, sp. n.
(рис. 1, 2)

Голотип — хранится в Институте зоологии АН УССР, препарат № 336—41а (травник — *Tringa totanus* L., ♂ ad., 6.VIII 1964, Тендровский залив Черного моря).

Описание. Длина стробилы 83 мм, максимальная ширина 0,45 мм.

Сколекс удлиненный, маленький, диаметр на уровне присосок 0,162 мм. Присоски небольшие, мускулистые, овальной формы, их размеры $0,075 \times 0,060$ мм. Влагалище хоботка размером $0,137 \times 0,098$ мм, обширное, двустенное, простирается за задний край присосок. Хоботок мощный, короткий, его длина 0,123 мм, диаметр у вершины — 0,103 мм. Хоботок вооружен десятью крючьями аплопараксоидного типа. Общая длина крючьев 0,034 мм, лезвия — 0,020 мм, корня — 0,025 мм, отростка корня — 0,013 мм, рукоятка слабо выражена. Шейка довольно длинная, шириной 0,118 мм.

Стробила состоит из многочисленных члеников. Ширина их превышает длину. Только зрелые маточные членики могут иметь приблизительно квадратную форму. Парус выражен слабо. Членики с развитыми семенниками имеют размеры $0,074-0,083 \times 0,220-0,250$ мм, членики с развитыми женскими железами — $0,118-0,123 \times 0,290-0,300$ мм, зрелые маточные — до $0,33 \times 0,45$ мм.

Мужские гонады развиваются и достигают зрелости значительно раньше женских. Клоака трубчатая, глубиной до 0,034 мм, открывается в середине порального края члеников.

Три семенника, как правило, расположены в линию. Однако в развитых мужских члениках такое расположение часто нарушается в результате смещения среднего семенника назад или одного из латеральных семенников вперед. Максимальный диаметр семенников 0,05 мм. Бурса цирруса относительно крупная, длиной 0,147—0,172 мм и толщиной 0,025—0,030 мм. Максимального развития она достигает в половозрелых женских члениках, простираясь своим дном чуть ли не до апоральных сосудов. Почти вся полость бурсы занята внутренним семенным пузырьком. Наружный семенной пузырек сравнительно небольшой — до $0,050 \times 0,035$ мм, прикрывает дорсально дно бурсы. Циррус очень маленький. Мы обычно наблюдали его втянутым в полость клоаки. Частично эвагинированный циррус длиной 0,025—0,030 мм состоит из короткой цилиндрической базальной части диаметром 0,005—0,006 мм, парабазального утолщения (бульбуза) диаметром 0,006—0,008 мм, вооруженного очень мелкими шипиками, и узкой — 0,002—0,003 мм — дистальной жгутовидной части, не вполне эвагинированной. Вагина открывается в клоаку вентрально или позади бурсы цирруса в виде маленькой вороночки, затем образует небольшое расширение диаметром 0,004—0,005 мм и переходит в тонкую проводящую часть, ведущую в расположенный вентрально от бурсы удлиненный семяприемник. Общая длина вагины 0,050—0,075 мм, максимальные размеры семяприемника $0,074 \times 0,034$ мм.

Женские железы закладываются между средним и апоральным семенниками или впереди среднего семенника. В развитом состоянии они занимают почти всю ширину среднего поля членика. Желточник бобовидный, компактный, размером $0,025-0,034 \times 0,039-0,044$ мм, расположен почти медиально, но может быть сдвинут апорально или по-рально. Яичник трехлопастный, шириной до 0,098—0,108 мм, залегает впереди желточника. Лопасти слабо разграничены. Матка закладывается в виде поперечной трубки и вскоре принимает вид подковообразного мешка с расширенными концами. В зрелом членике матка подковообразная, состоит из двух мешков, соединенных впереди перешейком. Ветви подковы могут быть сближены почти вплотную или же образуют тупой угол. Обычно матка не пересекает экскреторных сосудов, целиком располагаясь в среднем поле членика.

Немногочисленные яйца крупные, без филаментов, размером $0,044-0,049 \times 0,039-0,044$ мм. Онкосфера — $0,031-0,036 \times 0,025-0,030$ мм. Средние эмбриональные крючья тонкие, длиной около 0,018 мм, длина их круто изогнутого лезвия — 0,008 мм. Боковые эмбри-




Рис. 1. *Wardium smogorjevskiae* Kogniushin et Spassky, sp. n.:
а — сколекс; б — крючок хоботка.

ональные крючья длиной около 0,015 мм; их лезвие более массивное, длиной 0,005 мм.

Внутренний слой продольной мускулатуры, судя по тотальным препаратам, состоит из многочисленных пучков.

Продольных экскреторных сосудов две пары. Вентральные экскреторные сосуды широкие, диаметром до 0,03 мм, дорсальные — узкие, диаметром 0,007—0,010 мм. Поперечных анастомозов не видно.




Рис. 2. *Wardium smogorjevskajae* Корнюшин и Спасский, sp. н.:
а — половозрелые мужские членики; б — половозрелые женские членики; в — маточный членик; г — копулятивный аппарат; д — зародыш в эмбриофоре.

Изменчивость: длина зрелых экземпляров 75—92 мм, максимальная ширина — 0,39—0,51 мм. Диаметр сколекса 0,162—0,196 мм. Длина крючев хоботка 0,034—0,037 мм. Размеры внутренних органов (семенников, бурсы цирруса, желточника, яичника) не выходят за пределы, указанные для голотипа.

Материал: голотип и паратипы № 336—416—ж; 73—6а, б; 213—36а; 525—48а, б; 527—49а; 538—54а.

Хозяин: *Tringa totanus* L.

Локализация: тонкие кишki.

Эктенсивность инвазии: 10% (6 из 60 исследованных особей).

Интенсивность инвазии: 1—11 экз.

Место обнаружения: Тендровский залив Черного моря (УССР).

Дифференциальный диагноз. К роду *Wardium* различными авторами (Спасский и Спасская, 1954; Ошмарин, 1963; Спасский и Дао Ван Тьен, 1963; Гвоздев, 1964; Спасская, 1965, и др.) отнесено более десяти видов цестод птиц отряда Charadriiformes. Большинство из них от нового вида резко отличается малыми размерами хоботковых крючьев. Вид *W. clandestina* (Krabbe, 1869) имеет более длинные крючья — 0,047 мм (по Krabbe, 1869) и 0,043—0,046 мм (по Deblock et Rose, 1962, на материале Davies, 1939), иное строение цирруса (цилиндрической формы, без бульбуса).

По размерам крючьев к новому виду ближе других *W. matheviossiana* (Kuraschvili, 1950) — длина крючьев 0,030 мм и *W. limicolum* Spassky et Dao, 1963, длина крючьев 0,032—0,034 мм. Для первого из них характерно совершенно иное взаиморасположение половых желез: семенники залегают под углом, обращенным вершиной вперед, причем средний семенник, судя по рисунку, находится впереди и порально от желточника. По-видимому, существуют и другие анатомические отличия, но, к сожалению, внутреннее строение членников *W. matheviossiana* совершенно не описано, а рисунки очень схематичны. *W. limicolum* четко отличается по типу строения хоботковых крючьев, у которых рукоятка и отросток корня приблизительно одинаковой длины (у нашего вида рукояткаrudimentарна). Эвагинированный циррус *W. limicolum* более крупных размеров — 0,150×0,011 мм, цилиндрический. Наблюдаются существенные расхождения и в строении других органов.

Из видов рода *Wardium* паразитирующих у птиц других отрядов, (гусиные, чайки), только у *W. aequabilis* (Rudolph, 1810) размеры крючьев близки (0,027—0,032 мм) к таковым изученной нами цестоды. Но анатомия сколекса и стробилы этих гельминтов совершенно различны. Например, бурса цирруса *W. aequabilis* едва переходит за линию поральных сосудов, а матка имеет вид поперечной трубки; у описанной нами цестоды бурса почти достигает апорального края среднего поля, а матка подковообразно изогнута. Хоботковые крючья упомянутого паразита гусиных столь сильно уклонились от аплопараксоидных, что Рыжиков и Губанов (1959) даже определяют их как крицетоидные. Некоторое сходство крючьев *W. aequabilis* с крицетоидными крючьями гименолепидид грызунов действительно имеется, но оно чисто внешнее и неполное. При внимательном изучении и сопоставлении основных частей этих крючьев выявляются существенные различия. Даже соотношение размеров совершенно иное: у *W. aequabilis* лезвие крючьев длиннее рукоятки, а у крицетоидных крючьев цестод грызунов наоборот — рукоятка длиннее лезвия. Некоторое сходство этих двух типов крючьев, по нашему мнению, является результатом конвергенции в ходе эволюции фиксаторного аппарата. Крицетоидные крючья *Rodentolepis criceti* (Japicki, 1904) образовались, несомненно, путем видоизменения фратерноидных крючьев, которые свойственны подавляющей массе гименолепидид, составляющих типичное подсемейство и обитающих у грызунов, рукокрылых и некоторых насекомоядных. Род *Wardium* принадлежит другому подсемейству — *Aploparaksinae* Mayhew, 1925, и крючья *W. aequabilis*, как и аплопараксоидные крючья *Aploparaksis*, *Limnolepis*, относятся к другому морфогенетическому ряду.

Описанный вид сходен по размерам (0,033 мм) и форме крючьев с двумя представителями рода *Limnolepis* Spassky et Spasskaja, 1954, *L. annandalei* (Southwell, 1922) и *L. hamasigi* (Yamaguti,

1940). Однако эти виды отличаются от *W. smogorjevskaiae* топографией половых желез, а также иным строением копулятивного аппарата.

ЛИТЕРАТУРА

- Гвоздев Е. В. 1964. Ленточные черви охотничье-промышленных птиц Южного Казахстана. Тр. Ин-та зоол. АН КазССР. Паразиты животных Казахстана. Алма-Ата, 12.
- Скрябин К. И. и Матевосян Е. М. 1945. Ленточные гельминты—гименолепидиды домашних и охотничьих-промышленных птиц. М.
- Ошмарин П. Г. 1963. Паразитические черви млекопитающих и птиц Приморского края. М.
- Рыжиков К. М. и Губанов Н. М. 1959. К фауне цестод гусиных птиц Верхоянья (Якутия). Тр. ГЕЛАН СССР, 9, М.
- Спасский А. А. и Дао Ван Тьен. 1963. Два новых вида цестод рода *Wardium* (Hymenolepididae) от птиц Северного Вьетнама. Изв. АН МССР, 5. Кишинев.
- Спасская Л. П. 1965. Цестоды птиц СССР. Гименолепидиды. Автореф. докт. дисс. М.
- Yamaguti S. 1959. Systema helminthum. II. The Cestodes of Vertebrates. New York—London.

WARDIUM SMOGORJEVSKAJAE SP. N. (CESTODA, CYCLOPHYLLIDEA)— THE NEW SPECIES OF HYMENOLEPIDIDAE *TRINGA TOTANUS*

V. V. Kornyushin, A. A. Spassky

(Institute of Zoology, Academy of Sciences, Ukrainian SSR; Institute of Zoology, Academy of Sciences, Moldavian SSR)

Summary

When studying cestodes of snipes on the Black Sea Coast, sixty individuals of *Tringa totanus* L. nesting on the Tendrovsky Bay Coast were dissected for the complete helminthological investigation. They appeared to be infested to a great extent by cyclophyllidian cestodes of the genus *Wardium* namely, of representatives of new species *Wardium* named after the Ukrainian parasitologist L. A. Smogorzhevskaya. A description, drawings, and differential diagnosis of the new species are given.

The basic characters of a new species are: the scolex has 10 aploparksoid hooks 0.034—0.037 mm long, three testicles are in a line, the uterus is sacklike.

The type is kept in the Institute of Zoology, Academy of Sciences, Ukrainian SSR.