

- ного кісткового піднебіння у ссавців // Міжнар. конф. "Актуальні питання морфології, присвячена пам'яті акад., лауреата держ. премії України, проф. Сморшка С. А. (6 — 7 травня, 1996. Тернопіль, Україна): Збірник наук. робіт (мат. конф.). Т. II. — Тернопіль, 1996. — С. 310—312.
- Лихотоп Р. І., Білецька М. Г.* Новий тип конструкції вторичного костного неба у млекопитаючих // Доп. НАН України. Сер.: природн., математ. та техн. науки. — 1995. — N 10. — С. 135—137.
- Лихотоп Р. Й., Білецька М. Г.* Особливості конструкції вторинного кісткового піднебіння у благородного оленя // Морфофункциональний статус млекопитаючих и птиц: Тез. 3-ї наук. конф. морфологів України (червень 1995 р., Сімферополь). — Сімферополь, 1995. — С. 25—26.
- Тамаринов Л. П.* Морфологическая эволюция териодонтов и общие вопросы филогенетики. — М.: Наука, 1976. — 256 с.
- Шмальгаузен И. И.* Основы сравнительной анатомии позвоночных животных. — М.: Сов. наука, 1947. — 540 с.
- Broom R. L.* On the palate, occiput, and hind foot of *Bauria cynops* Broom // Amer. Mus. Novitat. — 1937. — 946. — P. 1—6.
- Crompton A. W.* On the dentition and tooth replacement in two bauriamorph reptiles // Ann. South Afric Mus. — 1962. — 46. — P. 231—255.
- Kuhn O.* Saugtierähnliche Reptilien (Therapsiden). Die neue Brehm-Bucherei. — Wittenberg, Lutherstadt: Ziemsen, 1970. — 80 S.
- Romer A. S.* The osteology of Reptiles. — Chicago: Univ. Press, 1956. — 722 p.
- Romer A. S.* Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. — Hamburg; Berlin: P. Parey, 1959. — 449 S.

ЗАМЕТКА

Neotropospeonellina subtrib. n. из Венесуэлы как ключ к познанию истории Leptodirini (Coleoptera, Leiodidae). [Neotropospeonellina subtrib. n. from Venezuela as Key to Knowledge of the History of Leptodirini (Coleoptera, Leiodidae)]. — Типовой род: *Neotropospeonella* Pace (Fauna hipogea u hemiedafica de Venezuela y otros países de America del Sur. — 1987. — 1. — Bucarest. — Edit. acad. Rep. Soc. Rom. — P. 195—197). До установления рода *Neotropospeonella* триба Leptodirini включала (вместе с *Antroherpon* и другими родами с широкими коготками), кроме почти девяти сотен европейских, преимущественно троглобионтных видов и подвидов из более чем 100 родов, лишь 3 монотипных рода из Южной Кореи и Приморского края (в том числе 2 троглобионтных) и два десятка видов из Турции, Ливана, Ирана, среднего Поволжья и с Кавказа, а также 2 крылатых, плоских, с хорошо развитыми глазами видов рода *Platycholeus* Horn с запада США, и палеарктическое происхождение трибы не оспаривалось. В 10-километровой пещере Гуахаро (Монагас, Венесуэла), образовавшейся в известняках нижнемелового возраста (оп. cit., р. 17—21), троглобионтный вид лептодирина был обнаружен на разложившихся остатках, происходящих от отрыгнутых гуахаро плодов пальм, бурзовых и лавровых. Глаза и крылья у *N. decui* отсутствуют, заднегрудь укорочена, усики длинные.

Подтриба Neotropospeonellina, помимо неотропического распространения и выпуклого тела, характеризуется наличием пары сложных шпор на вершинах всех голеней, узкими коготками и очень удлиненной средней частью склеротизированной сперматеки. Мола с зазубренным внутренним краем, нижняя губа с очень крупным, снабженным боковыми выростами склеритом, прикрывающим нижнюю часть лигул. Тело слабо выпуклое. Простернум с килем. Среднегрудной киль низкий. Более подробный диагноз подтрибы будет возможно дать после описания самца.

Фолеуноидный габитус венесуэльского рода — более слабое проявление параллелизма у троглобионтных леидид по сравнению с параллелизмом замечательной локальной неарктической катопоцирины *Glacicavicola* и балканских лептодирин с лептодионидным габитусом.

Поскольку предки *Neotropospeonella* могли попасть в Южную Америку не позже мела и только из Неарктики, их присутствие в мелу Неарктики вместе с плезиоморфиями *Platycholeina* (других настолько плоских, с хорошо развитыми глазами, способных к полету видов в трибе нет) делают запад Неарктики, ограниченный до конца мела с востока Внутриконтинентальным морем, наиболее вероятным центром происхождения Leptodirini. — Е. Э. Перковский (Международный Соломонов Университет, Киев).