

ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Новые данные о гнездовании малой поганки (*Podiceps ruficollis*) и хохлатой чернети (*Aythya fuligula*) в пойме р. Десна.—Достоверные данные о гнездовании малой поганки в пойме Десны получены только для окр. с. Коротченково Шосткинского р-на Сумской обл. Там, начиная с 60-х гг. и до нашего времени, отдельные пары периодически гнездятся на небольших пойменных озерах (Афанасьев и др., 1992) 29.04.89 г. две особи малой поганки отмечены в пойме нижнего течения Десны на отстойнике ТЭЦ-6 площадью 100×150 м в окр. с. Погребы Броварского р-на Киевской обл. Отстойник имеет покатые засыпанные гравием берега и частично зарос густым тростником и рогозом. 27.05. там же обнаружены 3 гнезда с насиженными кладками. Размеры яиц (N-5): 30,7×25,6; 37,4×26,0; 37,8×21,6; 36,4×26,2; 35,4×26,4. При вторичном обследовании 26.06 в одном гнезде были однодневные птенцы, а в другом — самка насиживала 8 яиц. Хохлатая чернеть в отличие от предыдущего вида относится к расселяющимся птицам Левобережья Украины. В пойме Десны ее продвижение на юг наблюдается с начала 80-х гг. (Афанасьев и др., 1992), но данные о гнездовании в нижнем течении реки получены пока только для окр. ТЭЦ-6, если не учитывать заметки А. Даниловича (1925) о наблюдении в 1925 г. выводка из 5 пуховиков и самки на болоте между селами Погребы и Зазимье. За прошедшие 60 лет впервые две пары хохлатой чернети отмечены 06.05.87 на заросшем карьере в р-не ТЭЦ-6, где они наблюдались на протяжении мая—июня. В 1988 и 1989 гг. несколько пар были обнаружены уже на отстойнике ТЭЦ в 800 м от карьера. 27.05.89 г. найдена самка хохлатой чернети с выводком, а 26.06. на карьере отмечена самка с одним птенцом. Гнездование вида в данном регионе в 1925 г. носило, по-видимому, случайный характер, а в настоящее время ближайшая точка его гнездования в пойме Десны обнаружена нами в 1988 г. в окр. с. Николевка Менского р-на Черниговской обл. около 250 км по руслу от с. Погребы. Поэтому, вероятнее всего, хохлатые чернети появились на искусственных водоемах ТЭЦ-6, не продвигаясь вниз по Десне, а со стороны водохранилищ Днепровского каскада, где отдельные пары отмечены на гнездовании на Киевском в 1966 г. (Мельничук, 1973) и на Каневском в 1977 г. (Клестов, 1987).—**С. В. Домашевский, Г. Г. Гаврич** (Институт зоологии НАН Украины, Киев).