

Первая достоверная находка *Coenonympha leander* Es p. (Lepidoptera, Satyridae) на Украине.— ♂ Одесская обл., Фрунзевский р-н, окр. с. Павловка, 20.05.1991. В прошлом этот вид неоднократно приводился для территории Украины: Крыма (Nordmann, 1851 : 409; Heyne, [1892] : 610; Seitz, 1909 : 143), Полтавской губернии (Czernay, 1854 : 219) и под сомнением — для Херсонской губернии (Шугуров, 1906 : 51), однако, последующими исследованиями эти указания ставились под сомнение, и вид не включался в списки чешуекрылых Украины; не обнаружен и соответствующий коллекционный материал в сохранившихся коллекциях. Вместе с тем нахождение этого вида на юге Украины ожидалось — вид был известен по находкам в начале века в Молдавии и в окр. Таганрога (Ростовская обл.).— **И. Г. Плющ** (Институт зоологии НАН Украины), **А. М. Архипов** (Одесское отделение УЭО).

Миксомицеты — объекты питания четырех видов лейодид из родов *Anisotoma* и *Agathidium* (Coleoptera, Leiodidae) в Каневском заповеднике.— 13—14.07.1994 г. в Каневском заповеднике (Черкасская обл.) на лежащих стволах граба нами были собраны: на *Ceratiomyxa fruticulosa* (Müll.) Macbr.— *Agathidium* (*Neoceble*) *confusum* Bris., на *Arcyria globosa* Schw.— *A. (N.) confusum* и *Anisotoma orbicularis* (Herbst), на *Arcyria fusca* Roth.— *A. orbicularis*, на *Stemonites fusca* Roth.— *A. orbicularis* и *A. humeralis*. 23.07.1994 тот же *A. orbicularis* был собран на *S. herbatlica* Пекк., *S. fusca* Roth., *Arcyria cinerea* Pers., *A. humeralis* — на *Stemonites ferruginea* Ehrens., *Agathidium* (s. str.) *laevigatum* Er.— на *Arcyria insignis* Kalchbr.— **Е. Э. Перковский** (Международный Соломонов университет), **Т. И. Кривомаз** (Киевский университет).