

Пресмыкающиеся холмогорья Бештепе (Румыния).— В Добрудже степная ящерица *Lacerta muralis* aff. *maculiventris* встречается в самых южных районах, а также указана для Тулчи и Бештепе на севере региона. Для Бештепе известны еще 2 вида рептилий — прыткая ящерица *Lacerta agilis* ssp. и носатая гадюка *Vipera ammodytes montandoni* (Fuhn, Vancsea, 1961, по сообщению Băcescu, 1934). 3.07.1992 мною обследована возвышающаяся над пойменной долиной грязь из 5 холмов (высота до 242 м), протянувшаяся между селами Beştepe и Mahmutlu на правом берегу Георгиевского гирла Дуная. Южные склоны и вершины холмов степные с каменистыми обнажениями, северные — покрыты густым лиственным лесом, редколесьем или зарослями кустарников. С юга к грязи примикиают поля, с севера — степные целинны участки и луга (используются как пастбища), небольшие поля, берег гирла с мелкими водоемами. За экскурсионный день обнаружены 4 вида рептилий. Греческая черепаха *Testudo graeca ibera* обычная для лесных опушек и полян с богатым разнотравьем (5 экз. на маршруте около 2 км). Зеленая ящерица *Lacerta viridis viridis* встречается на лесных опушках, в зарослях кустарников и под пологом леса (1—3 экз. на каждые 100 м маршрута). Крымская ящерица *Lacerta taurica taurica* населяет степные склоны, а также участки с сорной растительностью у подножия грязи в окр. с. Beştepe, численность невелика. Один желтобрюхий полоз (*Coluber caspius*) обнаружен на вершине холма в выпасаемой степи с каменистыми обнажениями. Для подтверждения наличия в Бештепе носатой гадюки необходимо обследование в апреле-мае. Прыткая ящерица, возможно, будет обнаружена в этом регионе (например, на лугах вдоль берега реки), но на холмах она отсутствует. Стенная ящерица здесь явно не встречается, и литературные сведения о находке вида в Бештепе (а также в Тулче) следует считать ошибочными. Вероятно, M. Băcescu (1934) принял за стенную ящерицу обитающую в Бештепе, но не указанную им крымскую ящерицу.— Т. И. Котенко (Институт зоологии АН Украины, Киев).