

С. Б. СОРОЧАН

## О так называемых рубчастых светильниках из Херсонеса

### Резюме

Рубчастые светильники из Херсонеса являются одной из наиболее многочисленных групп светильников и имеют широкое распространение в Северном Причерноморье. Часть их принадлежит к местным изделиям, а часть — к импортным, привозным (возможно, из Малой Азии).

Различаются два основных типа этих светильников — грушевидные и округло-яйцевидные. Их форма и декор связаны преемственностью с образцами удлиненной формы, украшенными стилизованной раковиной, которые датируются II—III вв. н. э. Рубчастые светильники появляются с самого начала столетия и бытуют вплоть до конца IV, а возможно, начала V в. До последнего времени один из вариантов указанных светильников, отмеченный сигнатурой ХРУСОГ, датировался второй половиной IV в. Однако следует пересмотреть эту датировку и отнести ее ко второй половине III в.

Изучение технологии изготовления экземпляров с этим клеймом дало возможность уточнить также некоторые детали производственного процесса, в частности факт довольно свободного обращения коропластов с половинками разных форм, применявшимися для изготовления аналогичных светильников.

Н. Г. БЕЛАН

## Фауна Трахтемирівського городища

В статті наведені основні результати вивчення кісткових залишків одного з найбільших на Київщині городищ скіфського часу. Воно розташоване на високому правому березі Дніпра поблизу с. Трахтемирова Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. Розкопки городища проводились у 1964—1969 рр. експедицією Інституту археології АН УРСР під керівництвом Г. Т. Ковпаненко<sup>1</sup>. Всього визначено 8311 кісток ссавців, що належали мінімально 623 особинам (табл. 1). Вони представлені 6 видами свійських і 9 видами диких тварин.

Бик свійський. За всі роки розкопок було визначено 2872 кістки свійського бика, мінімально від 122 особин. Вид представлений всіма частинами скелета; найчастіше трапляються фрагменти металодії, великогомілкових, променевих, плечових кісток, ізольовані зуби (табл. 2). За станом зубної системи нижніх щелеп і синостозу трубчастих кісток кінцівок<sup>2</sup> приходимо до висновку, що трахтемирівці в основному використовували в їжу молодих та напівдорослих тварин, яким належали 60% знайдених нижніх щелеп. Отже, в Трахтемирові зафіксовано більший процент молодняка, ніж в середньому в лісостепових пам'ятках скіфського часу<sup>3</sup>, але, можливо, це пов'язане з порівняно невеликою кількістю матеріалу в розглядуваному поселенні.

Нами не було знайдено жодного добре збереженого черепа, але на фрагментах черепів з лобною частиною виразно видно, що вони належали комолим екземплярам. Майже серед 3 тис. кісток зовсім немає фрагментів стрижнів, виявлено тільки один цілий стрижень, але за своїми розмірами і кольором, наймовірніше, він походить з шару іншого часу. Таким чином, свійський бик у Трахтемирові, як і в інших поселеннях скіфського часу, представлений безрогою формою. За браком матеріалу ми не можемо дати краніологічну характеристику трахтеми-

<sup>1</sup> Археологія Української РСР. К., 1971, т. 2, с. 80.

<sup>2</sup> *Ellenberger-Baum*. Handbuch der vergleichenden Anatomie der Haustiere. Berlin, 1943, S. 356; *Zietschmann O., Krölling O.* Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte der Haustiere. Berlin; Hamburg, 1955, S. 363.

<sup>3</sup> Цалкін В. И. Животноводство и охота племен восточноевропейской лесостепи в раннем железном веке.— МИА, 1966, № 135, с. 8.

Таблиця 1. Видовий склад ссавців з поселення поблизу с. Трахтемирів

Вид		Кістки	Особини
Бик свійський	<i>Boa taurus</i>	2872	122
Вівця : коза свійські	<i>Ovis aries et Capra hircus</i>	796	96
Свиня свійська	<i>Sus domesticus</i>	1274	148
Кінь свійський	<i>Equus caballus</i>	3001	134
Собака	<i>Canis familiaris</i>	90	36
Тур	<i>Bos primigenius</i>	2	1
Зубр	<i>Bison bonasus</i>	1	1
Олень звичайний	<i>Cervus elaphus</i>	113	31
Лось	<i>Alces alces</i>	45	11
Козуля	<i>Capreolus capreolus</i>	8	7
Свиня дика	<i>Sus scrofa</i>	133	31
Лисиця	<i>Vulpes vulpes</i>	2	2
Бобер	<i>Castor fiber</i>	3	2
Заєць	<i>Lepus europaeus</i>	1	1

рівської худоби, дуже мало також цілих трубчастих кісток кінцівок. Судячи з 25 метаподій, три чверті дорослого стада складали корови. Ці дані повністю підтверджуються значно більшими матеріалами з інших скіфських пам'яток. За даними В. І. Цалкіна<sup>4</sup>, корови становили 75,7%, бугаї — 5,7 та воли 18,6%. Зріст у холці трахтемирівської худоби коливається від 100 до 131 см, в середньому становлячи 112,5 см. За розмірами, пропорціями кісток і висотою в холці (табл. 3) свійський бик з Трахтемирова не відрізняється від худоби решти поселень скіфського часу Лісостепу.

Дрібна рогата худоба. На городищі вона поступається перед усіма іншими сільськогосподарськими тваринами і за кількістю кісток, і за числом особин, посідаючи четверте місце. Серед кісток скелета найчастішими знахідками є фрагменти нижніх щелеп та хребці. За станом зубної системи і віком нижні щелепи розподілились таким чином:

Стан зубної системи	Вік у місяцях	Кількість щелеп	
		абс.	%
$M_1 \epsilon - M_2$ відсутній	3—12	7	23,3
$M_2 \epsilon - M_3$ відсутній	12—24	11	36,7
$M_3 \epsilon$	старші за 24	12	40

На основі цих даних приходимо до висновку, що в іжу використовувались переважно молоді тварини. Одержані нами цифри відповідають даним В. І. Цалкіна для лісостепових пам'яток скіфського часу. Незважаючи на велику кількість матеріалу, через те, що кістки погано збереглися, серед них було дуже мало діагностичних. О. П. Журавльовим і автором визначено 26 кісток вівці та 24 — кози.

Знайдено сім кісткових стрижнів кози, шість з яких належали самцям та одна самиця. На них чітко виявленій статевий диморфізм. Стрижень козла досягав по передньому ребру 260 мм, а кози — тільки 155 мм. Стрижні самців були не тільки довшими, а й значно масивнішими: обхват біля основи у них становив 127—168 мм, в той час як у кози — 78 мм. Дві п'ясткові кістки можуть дати уявлення про зріст трахтемирівських кіз. Це невеликі тварини, які в холці повинні були мати 61 та 63 см<sup>5</sup>. За наведеними нижче розмірами кісток, кози з Трахтемирова близькі до тих, що розводилися у Київській Русі \*.

<sup>4</sup> Цалкін В. І. Вказ. праця, с. 19.

<sup>5</sup> Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, 1967, t. 36, s. 99—101.

\* Виміри кісток зроблені О. П. Журавльовим та автором.

Таблиця 2. Розподіл кісткових решток за частинами скелета

Кістки	Бик свійський	Вівця і коза	Свиня свійська	Кінь	Собака	Тур
Рогові стрижні, роги	2	17	—	—	—	—
Мозкова частина черепа	69	8	52	24	18	—
Лицьова частина черепа	72	23	193	45	8	—
Нижня щелепа	198	124	312	106	35	—
Окремі зуби	202	77	68	437	4	—
Хребці	92	96	98	106	—	—
Ребра	102	26	12	79	—	—
Лопатка	202	57	86	144	2	1
Плечова	195	67	75	248	6	—
Променева, ліктьова	260	61	98	222	1	1
Тазова	180	32	42	166	5	—
Стегнова	172	35	48	174	2	—
Гомілкові	239	55	63	257	5	—
Гляткова	98	14	32	121	—	—
Таранна	117	29	22	141	—	—
Дрібні кістки суглобів	63	6	3	104	—	—
Метаподії	373	58	54	354	4	—
Фаланги	236	11	16	273	—	—

Довжина вздовж переднього ребра кісткового стрижня рога	155 ±	260	—	—	—
Довжина його хорди	134	221	—	—	—
Обхват біля основи	78	168	155	± 127	± 143
Великий її діаметр	30	70,5	—	± 50	± 52
Малий діаметр	21	40,5	± 43	± 34	± 35
Альвеолярна довжина ряду кутніх зубів нижньої щелепи	82				
Теж саме молярів	54	51			
Довжина $M_3$	22	23,5			
Ширина нижнього кінця плечової кістки	29,5	30	32	37	
Ширина його суглобового блока	28,5	29,5	31	37	
Ширина верхнього кінця променевої кістки	27	30	34,5	35,5	
Найбільша довжина п'ясткової кістки	106	109			
Ширина її верхнього кінця	—	23			
Ширина її нижнього кінця	—	25,5			
Ширина її діафіза	—	15			
Ширина нижнього кінця гомілкової кістки	24				
Найбільша довжина таранної	33,5				

Серед діагностичних кісток вівці не було жодного стрижня чи лобової частини черепа. Виміри кісток дали такі результати:

Альвеолярна довжина ряду кутніх зубів нижньої щелепи	71	75			
Теж саме молярів	48	50			
Довжина $M_3$	—	21,5			
Ширина нижнього кінця плечової кістки	29	31	34	36	38,5
Ширина його суглобового блока	27	30	30	32	36,5
Найбільша довжина променевої	150				
Ширина її верхнього кінця	31	31,5	35,5		
Ширина її нижнього кінця	30				
Найбільша довжина п'ясткової	126				
Ширина її верхнього кінця	22,5	21			
Ширина її нижнього кінця	24,5				
Ширина її діафіза	15				
Ширина нижнього кінця гомілкової	24	25	26	27,5	28,5
Найбільша довжина таранної	34				29,5
Найбільша довжина плюсневої	130*	132	132,5	138,5*	148,5
Ширина її верхнього кінця	20	20,5	19,5	20,5	22,5
Ширина її нижнього кінця	—	23,5	22	24	26
Ширина її діафіза	11,5	11,5	11,5	12	12,5

\* Від напівдорослої особини.

Зубр	Лось	Олень зви-чайний	Козуля	Свиня дика	Лисиця	Бобер	Заєць
—	2	3	—	—	—	—	—
—	—	2	11	11	—	—	—
—	1	2	—	16	—	—	—
—	4	7	2	21	2	2	—
—	1	1	—	8	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	3	—	6	—	—	—
—	4	9	—	13	—	—	—
—	2	6	—	9	—	—	—
—	1	2	—	13	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—
—	1	5	—	4	—	—	—
—	5	31	—	9	—	—	—
—	1	16	—	8	—	—	—
—	1	3	—	1	—	—	—
—	11	13	4	6	—	—	—
—	10	10	—	7	—	—	—

Розміри кісток трахтемирівських овець входять в межі мінливості для овець Лісостепу з інших пам'яток раннього залізного віку і часів Київської Русі<sup>6</sup>. За довжиною променевої, п'ясткової та п'яти плюсневих кісток<sup>7</sup> висота в холці трахтемирівських особин становила 59,4—69,5 см, у середньому — 62,88 см.

Свиня свійська і дика. Кісткові рештки свиней досить численні в Трахтемирові. Близько половини всіх залишків складають фрагменти черепа (табл. 2). Про віковий склад тварин можуть свідчити 53 нижні щелепи, які за станом зубної системи розподілялись таким чином:

Стан зубної системи	Вік у місяцях	Кількість щелеп	
		абс.	%
$M_1$ — відсутній	до 6	2	3,8
$M_1$ e — $M_2$ відсутній	6—12	13	24,5
$M_2$ e — $M_3$ відсутній	12—22	15	28,3
$M_3$ e	старіше 22	23	43,4

Отже, в Трахтемирові молоді тварини, які ще не досягли дворічного віку, складали більше половини поголів'я. За даними В. І. Цалкіна, в інших пам'ятках Лісостепу того ж часу значно більше забивалося свиней 0,5—1-річного віку (44,8%), а процент дорослих дорівнював тільки 23,8. Можливо, така розбіжність пояснюється невеликою кількістю щелеп у Трахтемирові або особливостями сезону забою.

В нашому розпорядженні не було ні цілих черепів, ні їх добре збережених фрагментів, які дали б змогу навести краніологічну характеристику трахтемирівських свиней. В. І. Цалкін, дослідивши кісткові рештки свійських свиней з лісостепових поселень скіфського часу, дійшов висновку, що їх розміри були досить значними. Трахтемирівські свійські свині не становили винятку і майже за всіма ознаками були близькі до тварин, досліджених В. І. Цалкіним<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Тимченко Н. Г. К истории охоты и животноводства в Киевской Руси (Среднее Поднепровье). Киев, 1972, с. 99—103; Цалкін В. І. Указ. соч., с. 29—32.

<sup>7</sup> Цалкін В. І. Изменчивость метаподий у овец.— Бюллетень МОИП. Отдел биол., 1961, т. 66, вып. 5, с. 115—132.

<sup>8</sup> Цалкін В. І. Животноводство и охота., с. 39.

Таблиця 3. Мінливість розмірів кісток свійського бика

Ознака	Варіаційний ряд (мм)										Характеристика рялу				
	n	Lim	M	t <sub>tm</sub>	σ	n	Lim	M	t <sub>tm</sub>	σ	n	Lim	M	t <sub>tm</sub>	σ
Довжина M <sub>3</sub>	34 2 56 255	36 4 60 —	38 3 64 2	40 1 72 1	42 1 76 2	10	34—41,5	37,6	0,6	1,8	4,8				
Ширина нижнього суглобового блоку плюсової кістки	64 275	68 295	72 9	76 9	80 7	84 3	30	63—87,5	74,8	1,19	6,56	8,8			
Довжина променевої кістки	1 69	— 73	1 2	2 1	1 1	1 1	2	256,5—292	—	—	—	—			
Ширина верхнього кінця променевої кістки	61 57	65 4	69 4	73 3	85 4	89 2	93 2	69,5—94	79,95	1,99	6,9	8,6			
Ширина нижнього кінця променевої кістки	52 48	56 52	60 60	64 68	72 72	76 1	76 1	58—87,5	72,56	1,69	7,96	10,9			
Ширина нижнього кінця гомілкової кістки	23 1	19 23	19 19	12 12	4 4	1 1	79 79	50,5—75	59,72	0,58	5,15	8,6			
Найбільша довжина п'яточної кістки	113 107	119 113	125 125	131 131	137 143	149 149	17	107—146,5	128	2,11	8,46	6,6			
Найбільша довжина таранної кістки	56 54	58 56	60 60	62 62	64 66	68 70	72 72	74 74	55,5—72	63,24	0,46	4,04	6,3		
Найбільша довжина п'ясткової кістки	175 170	175 170	180 185	190 195	195 200	200 205	205 205	168,5—204	182,15	2,61	9,75	5,3			
Ширина верхнього кінця п'ясткової кістки	54 46	54 50	58 54	62 62	66 66	70 70	— —	— —	— —	— —	— —	— —			
Ширина нижнього кінця п'ясткової кістки	55 51	55 51	59 55	63 59	67 67	67 67	67 67	20	49—68	60	1,16	5,06	8,4		
Найбільша довжина плюсневої кістки	215 210	215 210	220 220	225 225	230 230	235 235	240 240	205,5—237,5	217	2,28	6,85	3,1			
Ширина верхнього кінця плюсневої кістки	50 46	50 46	54 50	58 54	— —	— —	— —	18	47—63	58,56	0,92	3,82	3,7		
Ширина нижнього кінця плюсневої кістки	55 51	55 51	59 55	63 59	67 67	67 67	67 67	10	42—57,5	48,4	1,38	4,16	3,3		
Найбільша довжина передніх фаланг	60 115	63 120	66 125	69 130	72 135	72 135	72 135	46	54—70,5	62,55	0,64	4,35	3,9		
Висота з холці (см)	5 105	9 110	4 115	1 120	1 130	1 135	1 135	25	100,6—130,4	112,5	1,67	3,35	4,4		

В зв'язку з цим виникають труднощі іншого порядку (табл. 4), оскільки в багатьох випадках важко провести чітку межу між свійськими і дикими свинями. Варіаційні ряди ідуть безперервно (виняток становлять ряди молярів верхньої щелепи та нижні кінці плечової кістки). Але за всіма ознаками можна розмежувати максимальні значення для свійських і мінімальні для диких свиней. Так, наприклад, максимальне значення довжини  $m^3$  у свійських — 37,5 мм, а мінімальне у диких — 39 мм, для довжини таранної кістки ці показники відповідно становлять 35 та 37 мм, для довжини п'яткової кістки — 91,5 і 97 мм. Дуже важко, на наш погляд, розділити нижні треті моляри. Виходячи з численних даних, як наших, так і одержаних іншими авторами приймаємо, що зуби довжиною 40 мм і вище належали дикій формі. Але слід мати на увазі, що зуби довжиною 36—40 мм могли належати та-кож свійським свиням. Отже, зіставлення кісток свійської і дикої свиней приводить до висновку, що в переважній більшості випадків за розмірами кістки цих двох видів розрізняються. У той же час частина їх, особливо фрагменти від молодих особин, які часто відносять до свійської форми, могли походити від дикої свині. Тому в Трахтемирові решток останньої мусило бути більше, ніж подано у табл. 1, при цьому треба врахувати, що більшість фрагментів було визначено на місці розкопок.

За коефіцієнтами, виведеними М. Тайхертом<sup>9</sup>, висота в холці свійських свиней коливалась від 71,5 до 85,5 см, а диких — від 87,5 до 120,5 см.

Кінь свійський. За кількістю кісток (3 тис.) кінь — найчисленіший вид в Трахтемирові. Він представлений всіма частинами скелета (табл. 2). Найчастіше траплялись зуби, фрагменти метаподій, великомілкових, плечових, променевих кісток, фаланги. Вони були дуже побиті, не збереглось жодного цілого черепа. З довгих трубчастих кісток кінцівок є 6 цілих променевих, 42 п'яткових та 32 плюснових. В основному визначені рештки походили від дорослих тварин. В іжу також використовувались молоді та напівдорослі особини, зокрема у чверті п'яткових кісток ще не приріс п'ятковий горб, що вказує на їх належність тваринам, які не досягли ще трирічного віку<sup>10</sup>. П'яткові кістки, за градацією О. О. Браунера<sup>11</sup>, належали крайнотонконогим (2,5%), тонконогим (12,5%), напівтонконогим (27,5%), середньоногим (52,5) і напівтовстоногим коням (5%). Отже, основну групу складали середньоногі та напівтонконогі особини. Плюсневі кістки за градацією того ж автора мали походити від тонконогих (58%), напівтонконогих (35,5%) та напівтовстоногих особин (6,5%). Мінливість розмірів та пропорцій кісток трахтемирівських коней наведена в табл. 5. Цілі променеві кістки (6) та метаподії (72) дали змогу, використовуючи таблицю В. О. Вітта<sup>12</sup>, визначити зріст тварин в холці.

Коні	Висота в хол- ці (см)	Кількість екз. абс.	%
Дуже дрібні	112—120	2	2,5
Дрібні	120—128	17	21,3
Малорослі	128—136	38	47,5
Середні	136—144	22	27,5
Рослі	144—152	1	1,2

<sup>9</sup> Teichert M. Osteometrische Untersuchungen zur Berechnung der Widerristhöhe bei vor- und frühgeschichtlichen Schweinen.— Kühn-Archiv, 1969, t. 83, S. 237—292.

<sup>10</sup> Zietschmann U. Op. cit., S. 363.

<sup>11</sup> Браунер А. А. Материалы к познанию домашних животных России. Лошадь курганных погребений. Одесса, 1916, с. 106—109.

<sup>12</sup> Вітт В. О. Лошади Пазырьских курганов.— СА, 1952, № 16.

Таблиця 4. Мінливість розмірів кісток свійської і дикої свиней

Ознака	Варіаційний ряд (мм)	Свиня Характери	
		n	Lim.
Альвеолярна довжина ряду кутніх зубів верхньої щелепи	105 110 115 120 2 4 1	7	105—119
Альвеолярна довжина ряду молярів верхньої щелепи	55 60 65 70 75 80 85 90 1 2 7 — 1 3 1	10	59,5—69,5
Довжина $M_3$	30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 6 9 3 3 3 2 2 — 1	21	30,5—37,5
Альвеолярна довжина ряду кутніх зубів нижньої щелепи	100 105 110 115 120 125 130 2 — 1 — 2 3	3	100,5—110,5
Альвеолярна довжина ряду молярів нижньої щелепи	60 65 70 75 80 85 90 95 100 1 2 1 1 5 2 — 1	5	64,5—75
Довжина $M_3$	30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 3 5 5 6 6 7 3 7 2 2	25	30,5—39,5
Ширина нижнього кінця плечової кістки	37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 5 9 7 2 — 1 2 3 2 3	23	37—44,5
Ширина нижнього суглобового блока плечової кістки	28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 1 5 10 8 — 1 6 6 — 1	24	29,5—35,5
Ширина верхнього кінця променевої кістки	28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 4 1 1 1 1 4 2 — 1	8	28,5—37
Найбільша довжина п'ясткової кістки III	75 80 85 90 95 100 105 110 115 1 — — — — — 1 1	1	79,5
Ширина нижнього кінця великогомілкової кістки	28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 3 6 3 1 3 5 7 1 1	13	28—35
Найбільша довжина п'ясткової кістки	80 85 90 95 100 105 110 115 2 1 1 3 3 4 5	4	81—91,5
Найбільша довжина таранної кістки	39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 3 1 1 2 1 2 2 4 3 2	8	40—47,5

Отже, найчисленніша група малорослих коней; до них примикають дрібні та середні; дуже дрібні і рослі особини представлені лише трьома екземплярами.

Порівняно з іншими пам'ятками Лісостепу<sup>13</sup> в Трахтемирові відносно частіше траплялись дрібні коні і було значно менше середніх. Тому трахтемирівські коні й в середньому були дещо нижчими. Підсумовуючи, приходимо до висновку, що вони за більшістю ознак не мали різких відмінностей від коней з інших лісостепових пам'яток раннього залізного віку, хоча середні значення вимірів є дещо нижчими.

Собака. Свійському собаці в Трахтемирові належали 90 кісток

<sup>13</sup> Цалкін В. И. Животноводство и охота., с. 45—48.

Свійська статистика ряду				Свиня дика Характеристика ряду					
M	$\pm m$	V	C	n	Lim.	M	$\pm m$	V	C
111,59	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65,5	1,1	3,3	5	5	79,5—88,5	83,5	—	—	—
33,28	0,44	1,98	5,9	8	39—47	41,5	1,15	3,06	7,3
105,17	—	—	—	5	123—128	125,3	—	—	—
69,4	—	—	—	8	80,5—97	85,19	—	—	—
35,56	0,53	2,68	7,5	21	40—49,5	43,96	0,57	2,57	5,9
40,52	0,37	1,78	4,3	11	47,5—57	52,72	0,88	2,62	4,9
33,08	0,35	1,7	5,1	14	38,0—47	42,14	0,5	1,82	4,3
31,56	—	—	—	7	38—44,5	40,14	—	—	—
—	—	—	—	2	108,5—112	—	—	—	—
31,3	0,5	1,74	5,5	17	37—45	40,06	0,51	2,06	5,1
84,75	—	—	—	15	97—113	108,15	1,51	5,65	5,2
43,24	0,85	2,24	5,1	13	49—57,5	54,16	0,73	2,52	4,6

мінімально від 36 особин. Більше половини решток складали нижні щелепи і мозкові частини черепа (табл. 2). Розміри більш-менш добре збережених черепів наведені в табл. 6. За класифікацією деяких авторів<sup>14</sup>, всі 4 черепи були середніх розмірів (основна довжина коливалась від 146,5 до 158 мм), два з них (№ 2, 3) належали тваринам середнім на зрист, висотою в холці 47,5 і 49,6 см<sup>15</sup>, а один (№ 4) — великому собачі, що досягав в холці 58,2 см.

<sup>14</sup> Weterynaria, 1967, N 21 (72), s. 15—71.

<sup>15</sup> Acta theriologica. Białowicza, 1967, N 12 (9), S. 105—110.

Таблиця 5. Мінливість розмірів і пропорцій кісток свійського коня

Ознака	Варіаційний ряд (мм, %)
Ширина нижнього суглобового блока плечової кістки	62 65 68 71 74 77 2 5 12 17 8
Найбільша довжина променевої кістки	300 305 310 315 2 3 1
Ширина верхнього кінця променевої кістки	68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 1 5 4 8 1 11 11 4 1 2
Ширина нижнього кінця променевої кістки	65 67 69 71 73 75 77 79 81 3 6 8 6 6 10 1 4
Ширина нижнього суглобового блока променевої кістки	54 56 58 60 62 64 66 2 4 8 8 11 5
Ширина нижнього кінця гомілкової кістки	60 63 66 69 72 75 78 6 15 21 17 14 4
Найбільша довжина п'ясткової кістки	95 99 103 107 111 115 6 6 8 4 3
Найбільша довжина таранної кістки	49 51 53 55 57 59 61 63 65 2 3 15 18 24 13 6 3
Найбільша довжина п'ясткової кістки	185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 2 2 1 6 2 9 10 9 1
Ширина верхнього кінця п'ясткової кістки	43 45 47 49 51 53 55 57 59 6 10 10 14 8 2 — 2
Ширина нижнього кінця п'ясткової кістки	41 43 45 47 49 51 53 6 12 17 21 11 7
Ширина діафіза п'ясткової кістки	28 30 32 34 36 38 5 9 9 16 1
Індекс ширини верхнього кінця ІІ	20 21 22 23 24 25 26 2 7 13 13 4 1
Індекс ширини нижнього кінця ІІ	20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 1 3 12 10 3 3 3 5
Індекс ширини діафіза ІІ	13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 1 1 4 4 7 11 10 1 1
Найбільша довжина плюсневої кістки	240 245 250 255 260 265 270 275 280 3 8 5 3 7 4 1 1
Ширина верхнього кінця плюсневої кістки	41 43 45 47 49 51 53 55 2 2 10 15 10 6 1
Ширина нижнього кінця плюсневої кістки	41 43 45 47 49 51 53 1 6 18 12 11 6
Ширина діафіза плюсневої кістки	27 28 29 30 31 32 33 34 2 2 5 8 4 8 2
Індекс ширини ІІ верхнього кінця	17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 2 7 8 7 5 1
Індекс ширини ІІ нижнього кінця	17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 1 7 10 6 3 2
Індекс ширини ІІ діафіза	10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 2 2 13 8 4 2
Найбільша довжина першої передньої фаланги	70 75 80 85 90 95 6 16 18 9 1
Ширина ІІ верхнього кінця	47 49 51 53 55 57 59 7 9 9 10 4 2
Ширина ІІ нижнього кінця	37 39 41 43 45 47 49 5 5 17 16 3 1
Ширина ІІ діафіза	30 32 34 36 38 40 10 13 13 12 2
Індекс ширини ІІ діафіза	38 40 42 44 46 48 4 18 17 8 3
Найбільша довжина першої задньої фаланги	65 70 75 80 85 90 3 5 14 14 5
Ширина ІІ верхнього кінця	45 47 49 51 53 55 57 59 1 5 9 9 7 5 2
Ширина ІІ нижнього кінця	35 37 39 41 43 45 47 2 4 9 17 6 1
Ширина ІІ діафіза	30 32 34 36 38 11 13 15 2
Індекс ширини ІІ діафіза	38 40 42 44 46 3 18 11 9
Висота в холці (см)	112 120 128 136 144 152 2 17 38 22 2

Характеристика ряду					
n	Lim.	M	$\pm m$	V	C
44	63—76,5	71,12	0,51	3,36	4,7
6	301,5—312,5	306,65	1,54	3,45	1,1
48	69—86	78	0,51	3,42	4,3
44	65—80,5	72,72	0,58	3,86	5,3
38	54,5—65	60,94	0,45	2,78	4,5
77	61—77,5	68,64	0,48	4,06	5,7
27	95—115	103,81	0,86	4,48	4,3
84	50—64	57,26	0,33	3,02	5,2
42	186,5—227,5	212,05	1,54	10	4,7
52	43—58	48,92	0,44	3,24	6,6
74	41—52,5	47,08	0,32	2,78	5,9
40	29—37	32,96	0,34	2,18	6,6
40	20—25,4	22,83	0,17	1,08	4,7
37	20,8—23,9	22,29	0,12	0,76	3,4
40	13,4—17,2	15,49	0,13	0,83	5,3
32	240—278	256,25	1,63	9,25	3,6
46	42—53,5	48,22	0,37	2,53	5,2
54	42—52,5	47,62	0,34	2,52	5,3
31	27,5—33	30,85	0,29	1,63	5,2
30	17,8—20	18,9	0,1	0,56	2,9
29	17,4—19,6	18,4	0,11	0,61	3,3
31	10,8—13,1	12,01	0,14	0,78	6,4
50	70—90,5	80,8	0,68	4,85	6
41	47—58,5	52,04	0,44	2,82	5,4
47	37,5—47	42,42	0,33	2,27	5,3
50	30—39	34,32	0,32	2,32	6,7
50	38—47,8	42,52	0,26	1,84	4,4
41	68—87	79,05	0,85	5,45	6,9
38	46—57,5	52,04	0,48	2,98	5,7
39	36—45,5	41,24	0,34	2,16	5,2
41	30—37,5	33,38	0,28	1,82	5,4
41	38,4—45,6	42,26	0,29	1,88	4,2
80	112—152	132,32	0,69	6,24	4,7

Таблиця 6. Розміри і пропорції черепів свійських собак

Ознака	мм	мм	%	мм	%	мм	%	мм
Найбільша довжина	154	159,5	108,4	167	114	167	110,6	176,5
Основна довжина	—	147	100	146,5	100	151	100	158
Внутрішня довжина мозкової коробки	—	79,5	54,1	77,5	52,9	88	58,3	—
Морфологічна лицьова вісь	74,5	78,5	53,4	84	57,4	—	—	—
Анатомічна лицьова вісь	±88	90	61,2	98	66,9±	102	67,5	—
Морфологічна мозкова вісь	—	88	59,9	87	59,5	—	—	—
Анатомічна мозкова вісь	—	81	55,1	79,5	54,3	79,5	52,6	—
Відстань від назіон до найбільш виступаючої точки потиличного гребеня	84	85,5	58,2	89,5	61,1	—	—	—
Те ж саме від лінії, яка з'єднує лобні відростки	±72,5	77	52,4	78	53,3	76	50,4	—
Довжина морди	67,5	67,5	45,9	72,5	49,5	74,5	49,4	75,5
Відстань від переднього краю очниці до нижньоокового отвору	21	19	12,9	22	15,2	22	14,6	21,5
Довжина кісткового піднебіння	79,5	81	55,2	83,5	57	—	—	87,5
Відстань від базіон до кісткового піднебіння	—	66	44,9	65	44,4	—	—	70
Довжина висових кісток по шву	48	—	—	55	37,5	—	—	—
» найбільша	54,5	—	—	62	42,4	—	—	—
Ширина морди між крайніми різцями	22	22,5	15,3	—	—	—	—	—
Те ж над іклами	32	±31	21,1	—	—	—	—	—
Те ж над Р <sup>1</sup>	51	51,5	35,1	55	37,5	—	—	—
Ширина міжочна	27,5	32,5	22,1	29	19,8	—	—	—
Ширина лоба найбільша	—	43,5	29,6	41,5	28,3	—	—	—
Ширина заочна	32,5	31,5	21,4	35,5	24,3	34	22,5	—
Ширина мозкової коробки	52,5	54,5	37,1	57	38,9	54,5	36,1	55
Ширина потилиці	56	56,5	38,4	56	38,3	58,5	38,8	60,5
Висота морди	27	30	20,4	27	18,4	—	—	—
Ширина кісткового піднебіння найбільша	43	46,5	31,7	41	28	—	—	—
Те ж саме між Р <sup>1</sup>	21,5	—	—	—	—	—	—	—
Висота мозкової коробки	45	47,5	32,3	48,5	33,1	48	31,8	59
Альвеолярна довжина ряду кутніх зубів	56	58	39,5	60	41	61	40,4	60
Довжина хижакького зуба по короні	18	17,5	11,9	19	13	—	—	17,5
Довжина обох молярів	—	17,5	11,9	—	—	—	—	19
Відстань від лінії, що з'єднує надочні відростки, до заочного звуження	13,5	16,5	—	13	—	±14,5	—	—
Відстань від заочного звуження до крайньої точки потиличного горба	61,5	63	—	66,5	—	60,5	—	—

Розміри трактемирівських собак показують також наведені нижче дані вимірюваннях нижніх щелеп, променевої, стегнової та великогомілкової кістки:

## Нижня щелепа

Артикулярна довжина	—	—	—	—	133,5	—	—	—
Ангулярна довжина	—	—	—	—	133	—	—	—
Альвеолярна довжина ряду кутніх зубів	65	66	66,5	67	73,5	81,5	—	—
Довжина М <sub>3</sub>	—	—	—	—	22,5	23	19	19,5
Основна довжина черепа*	144,5	147,4	148,9	152,3	169,2	192,4	—	—

\* Коєфіцієнт виведено Е. Даром (*Petri W. Neue Funde des Hundes aus dem Kelischen Oppidum von Manching. — Studien vor-und fühlgechichtlichen Tierresten Bayerns*, 1961, t. 10, S. 20.)

Кістки	променевої	стегнова	великогомілкової
Найбільша довжина	140	160	151,5
Ширина верхнього кінця	15,5	34,5	28
Ширина нижнього кінця	19,5	30	17,5
Ширина діафіза	11,5	13	10,5
Висота в холці*, см	45,1	48,2	44,2

\* Коефіцієнт виведено Ф. Куделкою (*Petri W. Op. cit., S. 55*).

За основною довжиною черепа, як обчисленою, так і вимірюю, трахтемирівські собаки подібні до собак з інших пам'яток ліосстепу скіфського часу. За нашими матеріалами і даними В. І. Цалкіна, більшість екземплярів мала основну довжину 140—160 мм. Висота в холці, що встановлена тільки в трьох випадках, коливалась від 44,2 до 48,2 см. Отже, розміри цих тварин були середні.

Т ур. Серед його кістних залишків знайдені лопатка і проксимальний кінець променевої кістки, їх розміри такі:

Ширина суглобової поверхні лопатки	96
Великий поперечник суглобової западини лопатки	75,5
Малий поперечник " "	67,5
Індекс суглобової западини лопатки (%)	89,4
Найменша ширина «шийки»	84
Ширина верхнього кінця променевої кістки	110,5
Передньо-задній поперечник його	56

Ці два фрагменти досить великі, вони відповідають місцю, яке за даними Ш. Бьюкене<sup>16</sup>, займають самці тура.

З у б р. На городищі виявлено нижній кінець плечової кістки, його ширина 103,5 мм, ширина суглобового блока 91 мм. За розмірами він потрапляє в межі мінливості для середньовічних зубрів Білорусії і субфосильних зубрів Литви<sup>17</sup>.

Л ось. Всього визначено 45 кісток лося, що належали, як мінімум, 11 особинам. Він представлений майже всіма частинами скелета, але виміри можна було зробити тільки на чотирьох екземплярах. Подаємо результати цих вимірювань.

Найбільша довжина п'ясткової кістки	346
Ширина верхнього кінця " "	61
Ширина нижнього кінця " "	40
Ширина діафіза " "	69,5
Найбільша довжина таранової кістки	76
Ширина нижнього кінця плюсневої кістки	63

О л е н ь з в и ч а й н и й. В Трахтемирові він був частим об'єктом полювання. Загалом визначено 113 кісток мінімально від 31 особини. Найчисленнішими є п'ясткові та таранні кістки (41% всіх залишків оленя). Добре збережені п'ясткова і плюснева кістки належали самкам, які мали невеликі розміри. Висота в холці<sup>18</sup> у них повинна була становити 117,6 і 125,5 см. За даними таблиці 7, місцеві олені не відрізнялися від ліосстепових з інших пам'яток раннього залізного віку і середньовіччя<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> Bökonyi S. Zur Naturgeschichte des Ures in Ungarn u. d. Problem der Domestizierung des Hausrindes.—Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1962, S. 194.

<sup>17</sup> Цалкін В. І. Fauna из раскопок в Гродно.—МИА, 1954, № 41, с. 211—236; Павлов К. Л. Формирование териофауны и изменчивость млекопитающих Восточной Прибалтики в голоцене. Таллин, 1965, с. 299—307.

<sup>18</sup> Rocznik: Wydziały Szkoly rolniczej w Poznaniu, 1965, t. 25, s. 39—51.

<sup>19</sup> Цалкін В. І. Животноводство и охота., с. 59—60; Тимченко Н. Г. Указ. соч., с. 30—37.

Таблиця 7. Розміри кісток звичайного оленя

Ознака	n	Lim.	M	$\pm m$	$\sigma$	C
Обхват розетки рога	3	175 205 282	220,66	—	—	—
Великий діаметр розетки рога	3	60,5 69 91	73,5	—	—	—
Малий діаметр II	3	49,5 56 87	64,16	—	—	—
Альвеолярна довжина ряду кутніх зубів нижньої щелепи	1	123	—	—	—	—
Те ж саме молярів	1	78	—	—	—	—
Довжина $M_3$	1	34,5	—	—	—	—
Ширина суглобового блока нижнього кінця плечової кістки	8	52 63,5	58	1,5	3,97	6,8
Ширина нижнього кінця променевої кістки	3	52 56 57	55	—	—	—
Найбільша довжина п'ясткової кістки	1	262,5	—	—	—	—
Ширина верхнього кінця	1	42,5	—	—	—	—
Ширина нижнього кінця	4	42—49	45,12	—	—	—
Ширина діафіза	1	25,5	—	—	—	—
Ширина нижнього кінця голілкової кістки	2	53,5 54	—	—	—	—
Найбільша довжина п'яткової кістки	19	116—139	129,36	1,09	4,66	3,6
Найбільша довжина таранної кістки	11	54—63,5	58,64	0,74	2,36	4
Найбільша довжина плюснової кістки	1	306	—	—	—	—
Ширина верхнього кінця	3	39 42,5	43	41,5	—	—
Ширина нижнього кінця	6	45,5—53	—	49	—	—
Найбільша довжина перших фаланг	8	60—65,5	62,37	0,69	1,84	2,9
Найбільша довжина других фаланг	5	43—48	45	—	—	—

Козуля. Остеологічний матеріал представлено нижніми щелепами, тазовою, п'ятковою, п'ястковою, плюсневою кістками. Вимірюти можна було тільки одну нижню щелепу і цілу п'ясткову кістку, їх розміри такі:

Альвеолярна довжина ряду кутніх зубів нижньої щелепи	70,5
Те ж саме молярів	39,5
Висота в діастемі найменша	11,5
Довжина (ширина $M_3$ )	316,5/7,5
Найбільша довжина п'ясткової кістки	180,0
Ширина верхнього кінця »	23,5
Ширина нижнього кінця »	22,5
Ширина діафіза	14,0

Ці кістки були невеликих розмірів і належали європейській козулі.

За співвідношенням решток диких і свійських тварин можна скласти уявлення про такі важливі галузі господарства жителів Трахтемирівського городища, як мисливство і скотарство. Більшість залишків належала свійським тваринам. Кістки диких, що складали 3,7%, походили від 14 особин (рис. 1). Отже, мисливство відігравало хоч і незначну, але помітну роль у господарстві. Близькі дані одержані на Хотівському городищі на Київщині (19,3%)<sup>20</sup> і Шарпів-

<sup>20</sup> Бібикова В. И. Из истории голоценовой фауны позвоночных в Восточной Европе.—Природная обстановка и фауны прошлого, 1963, вып. 1, с. 143; Петровська Є. О. Ранньоскіфські пам'ятки на південній склоніці Києва.—Археологія, 1970, т. 24.

ському на Черкащині (20,4%)<sup>21</sup>, що датуються також VI ст. до н. е. Основну здобич в Трахтемирові, як і на інших пам'ятках цього часу Правобережної України, становили дика свиня і звичайний олень, частка яких перевищувала 70% особин диких ссавців.

Свійські тварини представлені шістьма видами, п'ять з них (бик, вівця, коза, свиня і кінь) відігравали значну роль у господарстві трахтемирівців. За числом особин перше місце належало свійській свині, але за кількістю кісток на першому місці був кінь. Численність його решток, в тому числі від молодих особин, подрібність кісток вказують, що кінь у Трахтемирові, як і в інших поселеннях скіфського часу, широко використовувався в їжу. Свійський бик щодо кількості кісток займав друге місце, а щодо особин — навіть третє (рис. 2). Дрібна рогата худоба за обома показниками посідала останнє місце. Обчисливши середні значення корисної ваги особин кожного виду<sup>22</sup>, ми одержали дані про відносну кількість м'яса, яке могли використати трахтемирівці. За обсягом м'ясої продукції перше місце відведено великий рогатій худобі (37,8%), ій дещо поступається кінь (33,7%), свиня займає третє місце (24,4%), а на дрібну рогату худобу припадає лише 4,1%.

В підсумку слід ще раз звернути увагу на значну кількість решток свійських і диких свиней в Трахтемирові. І в наш час у цьому районі дуже сприятливі умови для розведення свиней (балки, дубовий гай). Очевидно, з середини I тисячоліття до н. е. до сучасного періоду ландшафт навколо Трахтемирова змінився мало.

Н. Г. БЕЛАН

### Фауна Трахтемировского городища

#### Резюме

В статье излагаются результаты изучения костных остатков из городища VI ст. до н. э., расположенного на правом берегу Днепра у с. Трахтемирово Переяслав-Хмельницкого р-на Киевской обл. Определено 8311 костей млекопитающих, принадлежавших минимум 623 особям. Большая часть остатков принадлежала домашним млекопитающим, 3,7% костей — диким и 14% составляли особи. Чаще других добывалась дикая свинья, постоянным объектом охоты были также благородный олень. Среди сельскохозяйственных животных по числу особей первое место занимала домашняя свинья, ей несколько уступала лошадь и домашний бык, на четвертом месте находился мелкий рогатый скот. По размерам костей животные из Трахтемирова сходны с животными из других памятников Лесостепи скіфского времени. По-видимому, за период с серединой I тысячелетия до н. э. до наших дней ландшафт вокруг Трахтемирова мало изменился.

<sup>21</sup> Цалкин В. И. Животноводство и охота., с. 101; Бибикова В. И. Указ. соч., с. 143.

<sup>22</sup> Тимченко Н. Г. Указ. соч., с. 145.




Рис. 1. Співвідношення між свійськими і дикими ссавцями за кількістю кісток (лівий стовпчик) і числом особин (правий стовпчик).

a — свійські; б — дики.

Рис. 2. Співвідношення між видами сільськогосподарських тварин за кількістю кісток (лівий стовпчик) і числом особин (правий стовпчик).

a — свійський бик; б — дрібна рогата худоба; в — свійська свиня; г — кінь.