

4. Opial Z. Continuous parameter dependence in linear systems of differential equations // Ibid. – 1967. – 3. – P. 571–579.
5. Левин А. Ю. Предельный переход для несингулярных систем  $\dot{X} = A_n(t)X$  // Докл. АН СССР. – 1967. – 176, № 4. – С. 774–777.
6. Левин А. Ю. Вопросы теории обыкновенного линейного дифференциального уравнения. I // Вестн. Ярослав. ун-та. – 1973. – Вып. 5. – С. 105–132.
7. Нгуен Тхе Хоан. О зависимости от параметра решений линейной системы дифференциальных уравнений // Дифференц. уравнения. – 1993. – 29, № 6. – С. 970–975.
8. Демидович Б. П. Лекции по математической теории устойчивости. – Москва: Наука, 1967. – 472 с.

Институт математики НАН Украины, Киев

Поступило в редакцию 07.04.2008

УДК 515.12

© 2008

Т. М. Радул

## Опуклості, породжені монадами

(Представлено членом-кореспондентом НАН України В. В. Шарком)

*Let  $\mathbb{F}$  be a monad in the category  $\text{Comp}$ . We build a convexity in general sense for each  $\mathbb{F}$ -algebra (see [1]), investigate properties of such convexities, and apply them to prove that the multiplication map of the monad of order-preserving functionals is soft.*

Поняття опуклості, що розглядається в цьому повідомленні, є значно загальнішим, ніж класичне поняття опуклості, обмежене контекстом лінійного простору. Загальні опуклості виникають при дослідженні розмаїтих структур: частково впорядкованих множин, напівграток, граток, суперрозширень тощо. Наш підхід базується на понятті топологічної опуклості з [1], де викладена загальна теорія опуклості, починаючи з аксіом і закінчуючи застосуваннями в різних галузях математики.

Головна мета роботи полягає в описанні категорного зв'язку між тополого-алгебраїчними структурами і теорією опуклості. Багато топологічних конструкцій є функторіальними: вони означені не тільки для просторів, а й для відображень. Алгебраїчний аспект теорії функторів у категоріях топологічних просторів та неперервних відображень базується в основному на понятті монади (чи трійки) у сенсі С. Ейленберга та Д. Мура [2]. Багато класичних конструкцій приводять до монад: гіперпростори, простори ймовірнісних мір, суперрозширення та ін. Багато досліджень присвячені монадам у категоріях топологічних просторів та неперервних відображень (див., напр., [3] або [4]). Для деяких з них вводились опуклості. Звичайна лінійна опуклість відповідає монаді ймовірнісних мір [5]. Певна нелінійна опуклість була означена для суперрозширення [6]. У цій роботі ми вводимо структуру опуклості для кожної  $\mathbb{F}$ -алгебри довільної монади  $\mathbb{F}$  у категорії компактних гаусдорфових просторів та неперервних відображень (п. 1), введені опуклості зберігаються морфізмами  $F$ -алгебр; досліджуємо властивості опуклостей для деяких спеціальних класів монад (ш. 2, 3); застосовуємо наші результати для дослідження топології монади функціоналів, що зберігають порядок (п. 4).

**1. Опуклості на алгебрах монад.** Через  $\mathcal{Comp}$  ми позначаємо категорію компактних гаусдорфових просторів (компактів) та неперервних відображень. Нехай  $X \in \mathcal{Comp}$ . Через  $CX$  позначаємо банахів простір неперервних функцій  $\phi: X \rightarrow \mathbb{R}$  із звичайною  $\sup$ -нормою:  $\|\phi\| = \sup\{|\phi(x)| \mid x \in X\}$ . Надалі всі простори і відображення вважаємо елементами  $\mathcal{Comp}$ , за винятком  $\mathbb{R}$  і функцій з  $CX$ , де  $X$  — компакт.

Нехай  $X$  — компакт. Сім'я  $\mathcal{C}$  замкнених підмножин  $X$  називається опуклістю на  $X$ , якщо  $\mathcal{C}$  є замкненою відносно перетинів і містить  $X$  та порожню множину. Елементи  $\mathcal{C}$  називаються  $\mathcal{C}$ -опуклими. Зауважимо, що ми розглядаємо в нашому означенні тільки замкнені опуклі множини. Усю сім'ю опуклих множин у сенсі [1] можна отримати, застосовуючи операцію об'єднання напрямлених угору підсімей. Кажемо, що опуклість  $\mathcal{C}$  породжує топологію  $X$ , якщо  $\mathcal{C}$  є замкненою передбазою  $X$ . Опуклість  $\mathcal{C}$  на  $X$  називають  $T_2$ , якщо для кожних  $x_1, x_2 \in X$  існують  $T_1, T_2 \in \mathcal{C}$  такі, що  $T_1 \cup T_2 = X$ ,  $x_1 \notin T_2$  і  $x_2 \notin T_1$ . Нехай  $(X, \mathcal{C})$ ,  $(Y, \mathcal{D})$  — два компакти із заданими опуклостями. Неперервне відображення називається  $f: X \rightarrow Y$   $CP$ -відображенням, якщо  $f^{-1}(D) \in \mathcal{C}$  для кожного  $D \in \mathcal{D}$ .

Нагадаємо деякі категорні поняття. Ми означаємо їх тільки для категорії  $\mathcal{Comp}$ . Функтор  $F: \mathcal{Comp} \rightarrow \mathcal{Comp}$  називається мономорфним, якщо він зберігає мономорфізми. Для мономорфного функтора  $F$  і вкладення  $i: A \rightarrow X$  ми утотожнюємо простір  $F(A)$  і підпростір  $F(i)(F(A)) \subset F(X)$ . Мономорфний функтор  $F$  зберігає перетини, якщо  $F(\bigcap\{X_\alpha \mid \alpha \in \mathcal{A}\}) = \bigcap\{F(X_\alpha) \mid \alpha \in \mathcal{A}\}$  для кожної сім'ї  $\{X_\alpha \mid \alpha \in \mathcal{A}\}$  замкнених підмножин  $X$ . Надалі розглядаємо мономорфні функтори, що зберігають перетини і одноточкові простори.

Також ми потребуватимемо означень, що стосуються монад і їх алгебр (детальніше див. [8]). Монада  $\mathbb{T} = (T, \eta, \mu)$  у категорії  $\mathcal{Comp}$  складається з функтора  $T: \mathcal{Comp} \rightarrow \mathcal{Comp}$  і натуральних перетворень  $\eta: \text{Id}_{\mathcal{Comp}} \rightarrow T$ ,  $\mu: T^2 \rightarrow T$ , що задовольняють рівності  $\mu \circ T\eta = \mu \circ \eta T = \mathbf{1}_T$  і  $\mu \circ \mu T = \mu \circ T\mu$ . ( $\text{Id}_{\mathcal{Comp}}$  позначає тотожний функтор у категорії  $\mathcal{Comp}$  і  $T^2$  є суперпозицією  $T \circ T$  функтора  $T$ .)

Нехай  $\mathbb{T} = (T, \eta, \mu)$  — монада в категорії  $\mathcal{Comp}$ . Пара  $(X, \xi)$ , де  $\xi: TX \rightarrow X$  — неперервне відображення, називається  $\mathbb{T}$ -алгеброю, якщо  $\xi \circ \eta X = \text{id}_X$  і  $\xi \circ \mu X = \xi \circ T\xi$ . Нехай  $(X, \xi)$ ,  $(Y, \xi')$  — дві  $\mathbb{T}$ -алгебри. Відображення  $f: X \rightarrow Y$  називається морфізмом  $\mathbb{T}$ -алгебр, якщо  $\xi' \circ Tf = f \circ \xi$ .

Природне перетворення  $\psi: T \rightarrow T'$  називається морфізмом монад  $\mathbb{T} = (T, \eta, \mu)$ ,  $\mathbb{T}' = (T', \eta', \mu')$ , якщо  $\psi \circ \eta = \eta' \circ \psi$  і  $\psi \circ \mu = \mu' \circ \eta T' \circ T\psi$ . Якщо всі компоненти  $\psi$  є мономорфізмами, то монада  $\mathbb{T}$  називається підмонадою  $\mathbb{T}'$  і  $\psi$  називається вкладенням монад.

Нехай  $(X, \xi) \in \mathbb{F}$ -алгеброю монади  $\mathbb{F} = (F, \eta, \mu)$  і  $A \in \mathcal{C}_{\mathbb{F}}$  є замкненою підмножиною  $X$ . Позначимо через  $f_A$  факторвідображення  $f_A: X \rightarrow X/A$  і покладемо  $a = f_A(A)$ . Означимо  $\mathbb{F}$ -опуклу оболонку  $\mathcal{C}_{\mathbb{F}}(A)$  множини  $A$  таким чином:  $\mathcal{C}_{\mathbb{F}}(A) = \xi((Ff_A)^{-1}(\eta(X/A)(a)))$ . Додатково покладемо  $\mathcal{C}_{\mathbb{F}}(\emptyset) = \emptyset$ . Означимо сім'ю  $\mathcal{C}_{\mathbb{F}}(X, \xi) = \{A \subset X \mid A \in \mathcal{C}_{\mathbb{F}}(A) \text{ і } \mathcal{C}_{\mathbb{F}}(A) = A\}$ . Елементи сім'ї  $\mathcal{C}_{\mathbb{F}}(X, \xi)$  називаємо  $\mathbb{F}$ -опуклими.

**Твердження 1.** Сім'я  $\mathcal{C}_{\mathbb{F}}(X, \xi)$  є опуклістю на  $X$ .

Зауважимо, що одноточкові множини завжди є опуклими.

**Теорема 1.** Нехай  $h: (X, \xi) \rightarrow (X', \xi')$  є морфізмом  $\mathbb{F}$ -алгебр. Тоді  $h$  є  $CP$ -відображенням.

**2. Опуклості  $L$ -монад.** Невідомо, чи означені нами опуклості породжують топологію, чи вони є  $T_2$ . Розглянемо клас монад, що породжують опуклості з цими властивостями.

**Означення 1.** Монада  $\mathbb{F} = (F, \eta, \mu)$  називається  $L$ -монадою, якщо для кожних  $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$  таких, що  $t_1 \leq t_2$ , існує відображення  $\xi_{[t_1, t_2]}: F[t_1, t_2] \rightarrow [t_1, t_2]$  таке, що пара  $([t_1, t_2], \xi_{[t_1, t_2]}) \in \mathbb{F}$ -алгеброю; для кожних  $t_1, t_2, t_3, t_4 \in \mathbb{R}$  таких, що  $t_1 \leq t_2 \leq t_3 \leq t_4$ , природне вкладення

$j: [t_2, t_3] \rightarrow [t_1, t_4]$  є морфізмом  $F$ -алгебр і для кожного  $X \in \text{Comp}$  існує сім'я морфізмів  $F$ -алгебр  $\{f_\alpha: (FX, \mu X) \rightarrow ([t_1(\alpha), t_2(\alpha)], \xi_{[t_1(\alpha), t_2(\alpha)]}) \mid \alpha \in A\}$ , що відокремлює точки.

Наше означення є невеликою модифікацією означення монади Лоусона з [7] і було дане в [9] під іншим іменем. Клас  $L$ -монад містить більшість відомих монад в  $\text{Comp}$ , зокрема суперрозширення, гіперпростір, імовірнісні міри та ін.

Нехай  $\phi \in CX$ . Через  $\max \phi$  ( $\min \phi$ ) позначимо  $\max_{x \in X} \phi(x)$  ( $\min_{x \in X} \phi(x)$ ), а  $\pi_\phi$  або  $\pi(\phi)$  буде позначати природну проєкцію  $\pi_\phi: \prod_{\psi \in CX} [\min \psi, \max \psi] \rightarrow [\min \phi, \max \phi]$ . У [9] показано, що

для кожної  $L$ -монади  $\mathbb{F} = (F, \eta, \mu)$  ми можемо розглядати  $FX$  як підмножину добутку  $\prod_{\phi \in CX} [\min \phi, \max \phi]$ , більше того, виконуються такі рівності:  $\pi_\phi \circ \eta X = \phi$ ,  $\pi_\phi \circ \mu X = \pi(\pi_\phi)$

для кожної  $\phi \in C(X)$  і  $\pi_\psi \circ Ff = \pi_{\psi \circ f}$  для кожної  $\psi \in C(Y)$ ,  $f: X \rightarrow Y$ .

Використовуючи схему доведення лєми 4 з [10], легко перевірити, що  $\nu \in FA \subset FX$  тоді й лише тоді, коли  $\pi_{\phi_1}(\nu) = \pi_{\phi_2}(\nu)$  для кожної  $\phi_1, \phi_2 \in CX$  такої, що  $\phi_1|A = \phi_2|A$ .

Нагадаємо, що функтор  $F$  зберігає прообрази, якщо для кожного відображення  $f: X \rightarrow Y$  і замкненої підмножини  $A \subset Y$  справджується рівність  $(F(f))^{-1}(F(A)) = F(f^{-1}(A))$ . Кажемо, що монада  $\mathbb{F} = (F, \eta, \mu)$  зберігає прообрази, якщо її функторіальна частина  $F$  зберігає прообрази. Отже,  $L$ -монада  $\mathbb{F} = (F, \eta, \mu)$  зберігає прообрази тоді й лише тоді, коли для кожного відображення  $f: X \rightarrow Y$  і замкненої підмножини  $A \subset Y$  справджується  $\pi_{\phi_1}(\nu) = \pi_{\phi_2}(\nu)$  для кожних  $\nu \in (Ff)^{-1}(A)$  і  $\phi_1, \phi_2 \in CX$  таких, що  $\phi_1|f^{-1}(A) = \phi_2|f^{-1}(A)$ .

Багато важливих монад не зберігають прообрази. Тому ми розглянемо слабшу умову.

**Означення 2.**  $L$ -монада  $\mathbb{F} = (F, \eta, \mu)$  слабо зберігає прообрази, якщо для кожного відображення  $f: X \rightarrow Y$  і замкненої підмножини  $A \subset Y$  справджується  $\pi_\phi(\nu) \in [\min \phi(f^{-1}(A)), \max \phi(f^{-1}(A))]$  для кожних  $\nu \in (Ff)^{-1}(A)$  і  $\phi \in CX$ .

Легко бачити, що якщо  $L$ -монада зберігає прообрази, то вона слабо зберігає прообрази.

**Теорема 2.** *Нехай  $\mathbb{F}$  —  $L$ -монада, що слабо зберігає прообрази. Тоді для кожного компакта  $X$  опуклість  $\mathcal{C}_{\mathbb{F}}(FX, \mu X)$  є  $T_2$  і породжує топологію.*

**3. Бінарні монади.** Розглянемо опуклості з властивістю бінарності. Нехай  $\mathcal{S}$  — деяка сім'я підмножин компакта  $X$ . Кажемо, що  $\mathcal{S}$  є зчепленою, якщо перетин кожних її двох елементів є непорожнім.  $\mathcal{S}$  називається бінарною, якщо перетин кожної її зчепленої підсистеми є непорожнім. Ми називаємо монаду  $\mathbb{F}$  бінарною, якщо сім'я  $\mathcal{C}_{\mathbb{F}}(X, \xi)$  є бінарною для кожної  $\mathbb{F}$ -алгебри  $(X, \xi)$ .

Нагадаємо деякі означення та факти з теорії неметризовних компактів. Детальнішу інформацію можна знайти в [11]. Компакт  $X$  називається відкрито-породженим, якщо  $X$  можна зобразити у вигляді границі  $\omega$ -спектра з відкритими граничними відображеннями. Відображення  $f: X \rightarrow Y$  називається  $(0)$ -м'яким, якщо для будь якого  $(0)$ -вимірного компакта  $Z$ , замкненої підмножини  $A$  в  $Z$  і відображень  $\Phi: A \rightarrow X$ ,  $\Psi: Z \rightarrow Y$  таких, що  $\Psi|A = f \circ \Phi$ , існує відображення  $G: Z \rightarrow X$  таке, що  $G|A = \Phi$  і  $\Psi = f \circ G$ .

**Теорема 3.** *Нехай  $\mathbb{F}$  — бінарна  $L$ -монада, що слабо зберігає прообрази, і  $X$  — компакт такий, що  $FX$  є відкрито-породженим (зв'язним) компактом. Тоді кожне відображення  $f: FX \rightarrow Y$  з  $\mathbb{F}$ -опуклими шарами є  $\theta$ -м'яким(м'яким), якщо  $f$  відкрите.*

**4. Монада функціоналів, що зберігають порядок.** Застосуємо одержані результати до дослідження топологічних властивостей монади функціоналів, що зберігають порядок  $\mathbb{O}$ .

Для кожного  $c \in \mathbb{R}$  через  $c_X$  ми позначаємо постійну функцію, означену таким чином:  $c_X(x) = c$  для кожного  $x \in X$ . Ми розглядаємо  $CX$  з природним частковим порядком,

визначеним таким чином: для кожних  $\phi, \psi \in CX$  справджується  $\phi \leq \psi$ , якщо  $\phi(x) \leq \psi(x)$  для кожного  $x \in X$ .

Функціонал  $\nu: CX \rightarrow \mathbb{R}$  називається:

слабо адитивним, якщо для кожного  $c \in \mathbb{R}$  і  $\phi \in CX$  справджується  $\nu(\phi + c_X) = \nu(\phi) + c$  і  $\nu(1_X) = 1$ ;

зберігаючим порядок, якщо для кожних  $\phi, \psi \in CX$  таких, що  $\phi \leq \psi$  справджується  $\nu(\phi) \leq \nu(\psi)$ .

У [10] показано, що кожен слабо адитивний функціонал, що зберігає порядок, є неперервним. Для компакта  $X$  через  $OX$  ми позначаємо множину всіх слабо адитивних функціоналів, що зберігають порядок. Розглядаємо  $OX$  як підпростір в  $\prod_{\phi \in CX} [\min \phi, \max \phi]$ .

Для кожного відображення  $f: X \rightarrow Y$  означимо відображення  $Of: OX \rightarrow OY$  таким чином:  $\pi_\psi \circ Of = \pi_{\psi \circ f}$  для кожної  $\psi \in C(Y)$ . Також ми означаємо природні перетворення  $\eta: \text{Id}_{\text{Comp}} \rightarrow O$  і  $\mu: O^2 \rightarrow O$  за допомогою таких умов:  $\pi_\phi \circ \eta X = \phi$ ,  $\pi_\phi \circ \mu X = \pi(\pi_\phi)$  для кожної  $\phi \in C(X)$ . Відомо, що  $\mathbb{O} = (O, \eta, \mu) \in L$ -монадою в  $\text{Comp}$  [10].

**Теорема 4.** Монада  $\mathbb{O}$  слабо зберігає прообрази.

Зауважимо, що монада  $\mathbb{O}$  не зберігає прообрази [10].

**Теорема 5.** Відображення  $\mu X$  відкрите для кожного компакта  $X$ .

**Теорема 6.** Відображення  $\mu X$  м'яке тоді й лише тоді, коли  $X$  відкрито-породжений компакт.

1. *van de Vel M.* Theory of convex structures. – Amsterdam: North-Holland, 1993. – 540 p.
2. *Eilenberg S., Moore J.* Adjoint functors and triples // Ill. J. Math. – 1965. – **9**. – P. 381–389.
3. *Заричный М. М., Радул Т. Н.* Монады в категории компактов // Успехи мат. наук. – 1995. – **50**. – С. 83–108.
4. *Teleiko A., Zarichnyi M.* Categorical topology of compact Hausdorff spaces. – Lviv: VNTL Publishers, 1999. – 263 p.
5. *Swirszcz T.* Monadic functors and convexity // Bull. Pol. Acad. Sci. – 1970. – **22**. – P. 39–42.
6. *de Groot J.* Supercompactness and superextension // Contributions to extension theory of topological structures. – Berlin: Deutsche Verlag der Wissenschaften, 1967. – P. 89–90.
7. *Radul T.* On functional representations of Lawson monads // Applied Categorical Structures. – 2001. – **9**. – P. 457–463.
8. *MacLane S.* Categories for working mathematicians. – Berlin: Springer, 1976. – 262 p.
9. *Radul T.* On strongly Lawson and I-Lawson monads // Bol. Mat. – 1999. – **6**. – P. 69–76.
10. *Radul T.* On the functor of order-preserving functionals // Comment. math. Univ. carol. – 1998. – **39**. – P. 609–615.
11. *Щепин Е. В.* Функторы и бесконечные степени компактов // Успехи мат. наук. – 1981. – **36**. – С. 3–62.

Львівський національний університет  
ім. Івана Франка

Надійшло до редакції 20.12.2007