



ЗАМЕТКИ

Мухи-дрозофіліди (Diptera, Drosophilidae) з культур їстівних грибів в Україні [The Drosophilid Flies (Diptera, Drosophilidae) in the Cultures of Edible Mushrooms in Ukraine]. — На їстівних грибах, що культивуються на Одещині, зібрано два види дрозофілід: *Drosophila buscki* Coquillett (відзначено вперше у фауні України) та *D. funebris* Fabricius, які зустрічались на початку заростання блоків з гливою (*Pleurotus*), ганодермою (*Ganoderma*), шиїтаке (*Lentinula*) та аурикулярією (*Auricularia*), розвивались на поверхні грибних блоків, де відбувається гниття та пошкодження мікроміцетами (іноді потрапляють на стадії інкубації). Дрозофіліди можуть переносити патогенні бактерії та мікроміцети і у такий спосіб наносити значну шкоду грибівництву. Матеріал зберігається в колекції Інституту зоології НАН України. — **В. О. Корнєєв** (Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України), **Н. М. Непомняща**, **С. П. Ужєвська** (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова).

Нові знахідки комарів-дзвінців (Diptera, Chironomidae) з Харківської області [New Records of Non-Biting Midges (Diptera, Chironomidae) from Kharkiv Region]. — Комарі-товкуни, або ж дзвінці в Україні є вивченими переважно на преімагінальних стадіях як важливий компонент харчової бази промислових риб, проте видове різноманіття хірономід є значно меншим за очікуване (Панкратова, 1970). Це пов'язано з тим, що їхні преімагінальні стадії часто не мають ознак для точної ідентифікації і можуть бути визначені у багатьох випадках тільки до груп видів (Панкратова, 1983); визначити видову приналежність часто можна тільки за дорослими особинами. Завдяки визначенню за імаго, виведеними з лялечок та личинок 4-го віку, автору вдалося виявити два види, що раніше не були зареєстровані в Україні. *Cricotopus perniger* (Zetterstedt, 1850): Харків: Саржин яр, 50°01'36"N 36°13'51"E, 28.09.2010, 5 ♂, 5 ♀ (Баранов). Поширення: Німеччина, Польща, Швеція, Фінляндія, Далекій Схід Росії. *Micropsectra atrofasciata* (Kieffer, 1911): Харків: Саржин яр, 50°01'36"N 36°13'51"E, 28.09.2010, 3 ♂, 1 ♀ (Баранов). Поширення: Західна Європа, Ліван, Алжир. Забарвлення дуже мінливе. Особини, отримані при виведенні мали два типи забарвлення: блідо-зелене та яскраво-жовте. Матеріал зберігається в Українському науково-дослідному інституті екологічних проблем (Харків). Назви наведено за Каталогом палеарктичних двокрилих (Ashe P., Cranston P. S. 1991. Catalogue of Palaearctic Diptera, vol. 2: Psychodidae—Chironomidae: 113–355). — **В. О. Баранов** (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).