

## РАДИОСПЕКТРОСКОПИЯ

УДК 539.184.2

А. С. КУЦЕНКО

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина,  
пл. Свободы, 4, г. Харьков, 61022, Украина  
E-mail: a.kutsenko@rian.kharkov.ua

### ЛАЗЕРНО-МИКРОВОЛНОВАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ СИНГЛЕТНЫХ $F$ -ТЕРМОВ АТОМА $Mg\ I$

*В работе представлены результаты измерений частот девяти двухфотонных ридберговских микроволновых  $3snf^1F_3 \rightarrow 3s(n+1)f^1F_3$  переходов атома  $Mg\ I$  с помощью лазерно-микроволнового спектрометра. Переходы наблюдались в частотном диапазоне  $56 \div 117$  ГГц и в диапазоне изменения главного квантового числа  $n = 30 \div 40$ . Из полученных данных была определена первая константа квантового дефекта, составившая  $E_j = 0.0517019(91)$ .*

*Ключевые слова:* магний, микроволновый спектр, ридберговские атомы, лазерное возбуждение

#### 1. Введение

Несколько десятков ридберговских рекомбинационных линий  $Mg\ I$  обнаружено в спектре излучения Солнца [1]. Линии наблюдались в дальнем инфракрасном диапазоне и были идентифицированы как переходы между состояниями с квантовыми числами  $n = 5 \div 8$  и  $l < 8$ , но идентификация не представлялась надежной. Это побудило провести ряд работ по микроволновой спектроскопии состояний с большим  $l$ . Авторы работы [2] в лабораторных условиях измерили частоты ридберговских микроволновых переходов  $Mg\ I$  для  $n = 17 \div 23$  между  $f, g, h, i$  состояниями и определили дипольную поляризуемость  $Mg^+$ . В работе [3] для  $n = 17$  были измерены частоты переходов между состояниями с  $6 \leq l \leq 11$ . После того как в 1980 г. для базы данных NIST [4] были проанализированы имеющиеся на тот момент данные о спектре  $Mg\ I$ , было проведено немало спектроскопических исследований магния в оптическом диапазоне. Методом высокоточной инфракрасной лазерной спектроскопии были записаны 23 ридберговских перехода  $Mg\ I$  в инфракрасном диапазоне,  $740 \div 1126\text{ см}^{-1}$ , [5]. Было установлено, что тонкая структура  $f$  состояний в диапазоне главного квантового числа  $n = 5 \div 7$  инвертирована. Кроме того, работа [5], а также проведенные в [1] расчеты позволили

идентифицировать некоторые ранее неизвестные линии в излучении Солнца. В [6] авторами методом бездоплеровской лазерной спектроскопии было проведено исследование ридберговских  $F$  состояний магния для  $n = 14 \div 84$ , что позволило им определить изотопические сдвиги и величину синглет-триплетного расщепления  $F$ -термов, а также расщепление сверхтонкой структуры изотопа  $^{25}Mg$ . В этом диапазоне главного квантового числа инверсия тонкой структуры уже не наблюдалась. В работе [7] в ходе оптического исследования были измерены энергии  $F$ -термов для  $n = 14 \div 66$  и определены квантовые дефекты для  $s, p, d, f$  состояний. Эта работа может считаться одной из лучших по данной проблеме. Однако расчеты частот микроволновых переходов по константам из [7] и сопоставления их с экспериментально измеренными частотами дают расхождения, достигающие единиц гигагерц. Это и не удивительно, т. к. в работе [7] константы квантового дефекта получены с низкой точностью из-за особенностей измерения длин волн переходов с привязкой к одной из линий неоновой лампы.


Цель настоящей работы – измерение частот микроволновых  $n^1F_3 \rightarrow (n+1)^1F_3$  синглет-синглетных ридберговских переходов  $Mg\ I$  и определение квантового дефекта  $F$  состояния с точностью, обычной для радиоспектроскопии, где измеряется не длина волны, а частота.

© А. С. Куценко, 2012

## 2. Детали эксперимента

Работа выполнена с использованием спектрометра, созданного на кафедре квантовой радиофизики Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Ранее с помощью этого спектрометра проводились исследования атомов Na, Al, Cu, Au, Ag в ридберговских состояниях, и их результаты опубликованы в [8–12]. В этих же работах представлено детальное описание спектрометра. Ниже приводятся только детали, касающиеся особенностей исследования атома Mg I.

Возбуждение атомов в ридберговские  $F$  состояния проводилось по различным двухступенчатым схемам (рис. 1):



В первой схеме для двухфотонного возбуждения состояния  $3s3d^1 D_2$  использовался лазер на красителе кумарин-540, который работал на фиксированной длине волны 431 нм. Для возбуждения ридберговских  $3snf^1 F_3$  состояний использовался лазер на красителе DCM, перестраиваемый в диапазоне 660 ÷ 680 нм. Оба лазера на красителях возбуждались импульсным ХеСl лазером (308 нм), работавшим с частотой повторения импульсов 10 Гц. Энергия импульса ХеСl лазера составляла 15 мДж, а длительность импульса – 40 нс. Время жизни уровня  $3s3d^1 D_2$  составляет 81 нс [7], что в два раза превышает длительность лазерных импульсов, поэтому временная задержка между импульсами возбуждения не подбиралась.




Рис. 1. Используемые схемы возбуждения  $3snf^1 F_3$  состояний атома Mg I: пунктирными стрелками обозначена первая схема возбуждения, сплошными стрелками – вторая

Ультрафиолетовое излучение для возбуждения первой ступени во второй схеме получалось путем удвоения частоты излучения лазера на красителе R6G в кристалле KDP. Для двухфотонного перехода в ридберговские состояния (вторая ступень) использовался ИК лазер на красителе LDS 751. Лазеры на красителях возбуждались второй гармоникой Nd:YAG лазера. Этот лазер работал с частотой повторения импульсов 12.5 Гц, имел длительность импульса 15 нс и энергию импульса зеленого света 10 ÷ 15 мДж. Все использованные в работе лазеры на красителях были с поперечной накачкой, работали в режиме скользящего падения луча на дифракционную решетку. Промежуточный уровень  $3s3p^1 P_1$  имеет время жизни 2 нс [13], поэтому оптическая разность хода была выбрана таким образом, чтобы импульсы лазера второй ступени поступали с задержкой не более 1 нс после окончания действия первого лазера.

Пучки обоих лазеров на красителях совмещались в параллельный пучок с помощью дихроичного зеркала и вводились в область взаимодействия излучения с атомным пучком. Поскольку в обеих схемах возбуждения использовались двухфотонные переходы, требовалась фокусировка лазерного луча соответствующей ступени в области взаимодействия. Для этой цели использовалась длиннофокусная СаF линза. Излучение вводилось в камеру через кварцевое окно перпендикулярно атомному пучку. Между двумя электродами, представляющими собой ионизационный конденсатор, формировалась область взаимодействия. Электроды имели диаметр 40 мм и находились на расстоянии 6.5 мм. За одним из электродов с отверстиями располагался каналотрон, напротив входного окна которого и формировалась область взаимодействия. С противоположной стороны в камеру вводилось микроволновое излучение. Его источником служил синтезатор микроволнового излучения на лампе обратной волны с несколькими петлями фазовой автоподстройки частоты, перекрывающий диапазон 59 ÷ 117 ГГц.

Источником атомного пучка была печь Кнудсена, представляющая собой полый цилиндр из нержавеющей стали, в который помещались стружки магния. Металл нагревался нихромовой спиралью, обмотанной вокруг цилиндра, до температуры 600 °С. Атомный пучок проходил

через щель шириной 2 мм и влетал в область взаимодействия между электродами.

Ридберговские атомы детектировались методом полевой ионизации. Через  $1.5 \div 2$  мкс после действия лазерного импульса на незаземленный электрод подавался отрицательный импульс с амплитудой  $50 \div 1000$  В и скоростью нарастания фронта не более 50 нс. Выходной сигнал каналотрона измерялся с помощью аналого-цифрового преобразователя. Для увеличения соотношения сигнал/шум проводилась многократная запись спектра в выбранном участке частотного диапазона.

Следует отметить, что в обеих схемах возбуждения появилась необходимость регулировать мощность импульса лазера первой ступени накачки. Дело в том, что даже при относительно небольшой энергии импульса возникала ионизация атомов в отсутствие возбуждения второй ступени и ионизирующего поля. Во второй схеме это может быть объяснено наличием ряда автоионизационных состояний магния вблизи порога ионизации [13, 14], сечение возбуждения которых значительны, и атом из первой ступени возбуждения переходит в автоионизационное состояние, поглощая еще один или два фотона излучения накачки первой ступени. Чтобы избавиться от вредного эффекта ионизации атомов в ходе возбуждения до включения ионизирующего импульса, мощность лазерного импульса первой ступени возбуждения уменьшалась до такого уровня, при котором паразитная ионизация была заметно меньше полезного сигнала и не превышала фон, обусловленный ионизацией ридберговских атомов, вызванной тепловым излучением печи и столкновениями с молекулами остаточных газов.

### 3. Результаты

Были измерены частоты девяти двухфотонных  $3snf^1F_3 \rightarrow 3s(n+1)f^1F_3$  ридберговских микроволновых переходов в диапазоне частот  $53 \div 117$  ГГц и в диапазоне главного квантового числа  $n = 30 \div 40$ . Результаты измерений приведены в табл. 1. Типичные записи микроволновых переходов представлены на рис. 2. Ширина линий определялась несколькими факторами. Время нахождения ридберговских атомов в области взаимодействия с лазерным и микроволновым излучением составляло не менее 2 мкс, что приводило к пролетному уширению резонанса не более чем

Таблица 1. Частоты наблюдаемых двухфотонных микроволновых  $n^1F_3 \rightarrow (n+1)^1F_3$  резонансов Mg I. В последнем столбце представлены разности наблюдаемых частот и частот, рассчитанных с помощью формул Ридберга (1) и Ритца (2)

Переход	Центральная частота, МГц	Разность частот, МГц
$30^1F_3 \rightarrow 31^1F_3$	2·116603.0	-0.372
$31^1F_3 \rightarrow 32^1F_3$	2·105826.5	0.513
$32^1F_3 \rightarrow 33^1F_3$	2·96337.7	0.243
$33^1F_3 \rightarrow 34^1F_3$	2·87950.3	0.023
$34^1F_3 \rightarrow 35^1F_3$	2·80509.2	0.217
$35^1F_3 \rightarrow 36^1F_3$	2·73884.2	-0.107
$36^1F_3 \rightarrow 37^1F_3$	2·67966.8	-0.036
$37^1F_3 \rightarrow 38^1F_3$	2·62664.6	-0.450
$39^1F_3 \rightarrow 40^1F_3$	2·53606.0	-1.621




Рис. 2. Типичные записи микроволновых двухфотонных  $3snf^1F_3 \rightarrow 3s(n+1)f^1F_3$  переходов Mg I: переходы  $37^1F_3 \rightarrow 38^1F_3$  (вверху) и  $30^1F_3 \rightarrow 31^1F_3$  (внизу). На верхней панели асимметрия контура вызвана смешением  $n^1F_3 \rightarrow (n+1)^1F_3$  и  $(n+1)^1P_1 \rightarrow (n+2)^1P_1$  резонансов (пояснения в тексте)

до 0.5 МГц. Доплеровское уширение, по нашим оценкам, не превышало 0.5 МГц. Наблюдаемая ширина резонансов составила 3÷4 МГц, что связано, по-видимому, с наличием паразитных электростатических и высокочастотных полей в камере, приводящих к уширению из-за эффекта Штарка и, частично, из-за эффекта насыщения микроволновых переходов при наблюдении двухфотонных резонансов, когда на атомы действует излучение гораздо большей мощности чем в ситуации, при которой наблюдаются однофотонные резонансы.

Магний с естественной концентрацией изотопов включает в себя три стабильных изотопа  $^{24}\text{Mg}$  (79 %),  $^{25}\text{Mg}$  (10 %),  $^{26}\text{Mg}$  (11 %), из которых только  $^{25}\text{Mg}$  имеет сверхтонкую структуру, обусловленную ядерным спиновым взаимодействием. Наиболее распространенный изотоп  $^{24}\text{Mg}$ , как и изотоп  $^{26}\text{Mg}$ , имеет ядерный спин  $I=0$  и сверхтонкой структуры не проявляет. Расчеты сверхтонкого расщепления и изотопического сдвига, основанные на данных из [6], показали, что изотопический сдвиг для переходов с  $n=30\div 40$  не превышает 0.1 МГц и приводит только к некоторой асимметрии наблюдаемых линий.

Резонансные частоты переходов, как правило асимметричных, определялась по максимуму ионизационного тока записанных частотных зависимостей. При этом погрешность составляла величину, не превышающую 10÷15 % ширины резонанса (не более 0.5 МГц).

Для обработки результатов эксперимента следовало бы пользоваться многоканальной теорией квантового дефекта из-за сложности электронного строения атома (два валентных электрона) и наличия возмущающей конфигурации  $3p^2^1D_2$ , которая наиболее сильно возмущает  $D$  состояние [15]. Однако, ряд работ [15, 16], а также анализ оптических измерений показали, что ридберговские ( $n > 8$ )  $F$  состояния мало подвержены возмущению, квантовый дефект изменяется плавно, поэтому для их анализа допустимо использовать одноканальную теорию квантового дефекта. Энергия терма для квантовых чисел  $n, l, j$  может быть найдена с помощью формулы Ридберга,

$$E(n, l, j) = \frac{-R_{\text{Mg}}}{n^{*2}} = \frac{-R_{\text{Mg}}}{(n - \delta_{n,l,j})^2}, \quad (1)$$

где  $R_{\text{Mg}}$  – постоянная Ридберга для магния; квантовый дефект  $\delta_{n,l,j}$  определяется формулой Ритца,

$$\delta_{n,l,j} = E_{l,j} + \frac{A_{l,j}}{n^{*2}} + \frac{B_{l,j}}{n^{*4}} + \dots, \quad (2)$$

(здесь  $E_{l,j}$ ,  $A_{l,j}$  и  $B_{l,j}$  – константы).

Методом наименьших квадратов из экспериментальных данных было определено значение константы  $E_{l,j}$  (табл. 2). Разность измеренных частот и частот, рассчитанных с помощью этой константы по формулам (1), (2), приведены в табл. 1 в третьем столбце. Большая ошибка для перехода  $39^1F_3 \rightarrow 40^1F_3$  связана с тем, что вместе с  $3snf^1F_3$  состояниями также легко возбуждаются  $3s(n+1)p^1P_1$  состояния. Разность между первой константой квантовых дефектов этих состояний близка к единице, поэтому разность частот двухфотонного перехода  $39^1F_3 \rightarrow 40^1F_3$  и двухфотонного перехода  $40^1P_1 \rightarrow 41^1P_1$  меньше типичной наблюдаемой ширины линии. По этой причине в нашем эксперименте эти переходы не разрешены (так же, как на рис. 2, верхняя панель). Большая ширина и асимметрия интегрального контура не позволяют определить частоту перехода  $39^1F_3 \rightarrow 40^1F_3$  точнее. Среднеквадратичное отклонение рассчитанных частот от измеренных составило 0.39 МГц. При расчете постоянная Ридберга для магния принималась равной  $R_{\text{Mg}} = 3289767.7064$  ГГц. Для сравнения в табл. 2 приведены константы квантового дефекта, полученные с помощью измерений в оптическом диапазоне другими авторами.

#### 4. Заключение

С помощью лазерно-микроволнового спектрометра были измерены частоты девяти двухфотонных ридберговских микроволновых  $3snf^1F_3 \rightarrow 3s(n+1)f^1F_3$  переходов атома Mg I. Переходы наблюдались в частотном диапазоне 56÷117 ГГц и в диапазоне изменения главного квантового числа  $n=30\div 40$ . На основе

Таблица 2. Константы квантового дефекта (выражения (1) и (2)) для  $3snf^1F_3$  состояний Mg I, определенные с помощью метода наименьших квадратов из экспериментальных данных

	$E_{l,j}$	$A_{l,j}$	$B_{l,j}$
Настоящая работа	0.0517019(91)	–	–
Работа [7]	0.049(2)	–	–
Работа [16]	0.05274	–6.35048	–3.59136

экспериментальных данных было определено значение первой константы квантового дефекта  $E_{l,j} = 0.0517019(91)$  с точностью на два порядка выше точности полученных ранее значений [7]. В дальнейшем мы планируем усовершенствовать наш спектрометр с целью записи частот переходов с низкими значениями главного квантового числа  $n$ , что позволит с высокой точностью найти коэффициенты  $A_{l,j}$  и  $B_{l,j}$  в выражении (2) и, соответственно, с высокой точностью рассчитать энергетический спектр синглетного  $F$  состояния магния.

Автор благодарен М. П. Перепечая и Н. Л. Погребняку за помощь в подготовке эксперимента, В. А. Ефремову – за помощь в обработке результатов измерений и профессору С. Ф. Дюбко – за постановку задачи и постоянный интерес к выполняемой работе.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Chang E. S. Solar Emission Lines Revisited: Extended Study of Magnesium // Phys. Scripta. – 1987. – Vol. 35. – P. 792–797.
2. Lyon B. J. and Gallagher T. F. Mg  $3snf-3sng-3snh-3sni$  intervals and the  $Mg^+$  dipole polarizability // Phys. Rev. A. – 1998. – Vol. 57, No. 4. – P. 2426–2429.
3. Snow E. L. and Lundeen S. R. Determination of dipole and quadrupole polarizabilities of  $Mg^+$  by fine-structure measurements in high- $L$   $n=17$  Rydberg states of magnesium // Phys. Rev. A. – 2008. – Vol. 77, No. 5. – P. 052501.1–052501.6.
4. Martin W. C. and Zalubas R. Energy Levels of Magnesium, Mg I through Mg XII // J. Phys. Chem. Ref. Data. – 1980. – Vol. 9, No. 1. – P. 1–58.
5. Lemoine B., Petitprez D., Destombes J. L., and Chang Edward S. High-precision infrared diode laser spectrum of Mg I // J. Phys. B.: At. Mol. Opt. Phys. – 1990. – Vol. 23., No. 13. – P. 2217S–2226S.
6. Begang R. and Schmidt D. Doppler-free three photon spectroscopy of  $3snf$  Rydberg states of Mg // Phys. Rev. A. – 1984. – Vol. 29, No. 5. – P. 2581–2585.
7. Rafiq M., Kalyar M. A., and Baig M. A. Multi-photon excitation spectra of the  $3snl$  ( $l = 0, 1, 2$  and  $3$ ) Rydberg states of magnesium // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. – 2007. – Vol. 40, No. 15. – P. 3181–3196.
8. Dyubko S., Efimenko M., Efremov V., and Podnos S. Microwave spectroscopy of S, P, and D states of sodium Rydberg atoms // Phys. Rev. A. – 1995. – Vol. 52, No. 1. – P. 514–517.
9. Dyubko S. F., Efremov V. A., Gerasimov V. G., and MacAdam K. B. Millimetre-wave spectroscopy of Au I Rydberg states: S, P and D terms // J. Phys. B. – 2005. – Vol. 38, No. 8. – P. 1107–1118.
10. MacAdam K. B., Dyubko S. F., Efremov V. A., Gerasimov V. G., and Perepechay M. P. Microwave spectroscopy of Ag I atoms in Rydberg states: S, P and D terms // J. Phys. B. – 2009. – Vol. 42, No. 8. – P. 085003.1–085003.6.
11. MacAdam K. B., Dyubko S. F., Efremov V. A., Gerasimov V. G., and Kutsenko A. S. Laser-microwave spectroscopy of Cu I atoms in S, P, D, F and G Rydberg states // J. Phys. B. – 2009. – Vol. 42, No. 16. – P. 165009.1–165009.8.
12. Dyubko S. F., Efremov V. A., Gerasimov V. G., and MacAdam K. B. Microwave spectroscopy of Al I atoms in  $l=0$  to 4 Rydberg states: comprehensive quantumdefect analysis // J. Phys. B. – 2004. – Vol. 37, No. 9. – P. 1967–1978.
13. Rafiq M., Hussain Sh., Saleem M., Kalyar M. A., and Baig M. A. Measurement of photoionization cross section from the  $3s3p^1P_1^o$  excited state of magnesium // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. – 2007. – Vol. 40, No. 12. – P. 2291–2305.
14. Schinn G. W., Dai C. J., and Gallagher T. F. Mg  $3pns$  and  $3pnd$  ( $J=1$ ) autoionizing states // Phys. Rev. A. – 1991. – Vol. 43, No. 5. – P. 2316–2327.
15. Beigang R. and Schmidt D. Two-photon spectroscopy of  $3snd^1D_2$  Rydberg states of Magnesium // Phys. Lett. – 1981. – Vol. 87A, No. 1, 2. – P. 21–23.
16. Zhi Miao-Chan, Dai Chang-Jian, and Li Shi-Ben. Stark structure of the Rydberg states of alkaline-earth atoms // Chinese Phys. – 2001. – Vol. 10, No. 10. – P. 929–934.

О. С. Куценко

Харківський національний університет  
імені В. Н. Каразіна,  
пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна

#### ЛАЗЕРНО-МІКРОХВИЛЬОВА СПЕКТРОСКОПІЯ СИНГЛЕТНИХ $F$ -ТЕРМІВ АТОМА $Mg I$

Надаються результати вимірювання частот дев'яти двофотонних рідбергівських мікрохвильових  $3snf^1F_3 \rightarrow 3s(n+1)f^1F_3$  переходів атома  $Mg I$  за допомогою лазерно-мікрохвильового спектрометра. Переходи спостерігались у частотному діапазоні  $56 \div 117$  ГГц та в діапазоні зміни головного квантового числа  $n = 30 \div 40$ . Зотриманих даних була визначена перша константа квантового дефекту, що становила  $E_{lj} = 0.0517019(91)$ .

A. S. Kutsenko

V. Karazin National University of Kharkiv,  
4, Svoboda Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine

#### LASER-MICROWAVE SPECTROSCOPY OF SINGLET $F$ -TERMS OF $Mg I$

Results of frequency measurements of nine double-photon Rydberg-Rydberg microwave  $3snf^1F_3 \rightarrow 3s(n+1)f^1F_3$  transitions of Mg I by means of a laser-microwave spectrometer are presented. The transitions were observed in the frequency range  $56-117$  GHz and in the range of the principal quantum number variation  $n = 30-40$ . Using the data obtained the first constant of Ritz quantum defect expansion has been determined as  $E_{lj} = 0.0517019(91)$ .

Статья поступила в редакцию 12.04.2012